



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 10 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 10 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 19.4 - 25°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.2°C, tổng lượng mưa là 446mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.8^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.6^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 315.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 136.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 284.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 44.6 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-03/11 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 04-06/11, có mưa to, có nơi mưa rất to (riêng ngày 04/11 mưa tập trung ở phía Nam). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 07-11/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 08-10/11 phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày 11/11 có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.8	21.7	23.7	761.4
Trong tuần	25.0	19.4	22.2	446.0
Tuần tới	26.3	18.7	22.5	161.6

II. Đặc trưng nông nghiệp

Khu vực Bắc Trung Bộ tuần này tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, do đó nhiều diện tích cây trồng vẫn trong tình trạng bị ngập úng, đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 03 tháng 10 như sau:

Lúa hè thu, lúa mùa sớm và lúa chính vụ đã thu hoạch xong, lúa mùa muộn giai đoạn trổ - chín và thu hoạch. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động dao động từ 19.4 - 25.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.2°C, tổng lượng mưa là 446.0mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần giảm so với tuần trước tuy nhiên vẫn gần 500mm, điều kiện thời tiết tuần này không phù hợp với cả diện tích lúa mùa muộn và diện tích đồng ruộng đã thu hoạch đang giai đoạn cải tạo đất. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh thối thân, ốc bươu vàng. Với số liệu dự báo, tuần tới nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa giảm, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp: bệnh thối đen lép lửng, sâu phao. Đối với phần diện tích lúa bị ngập úng lâu ngày, sau khi nước rút cần vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư, cày bừa phơi đất, xử lý đất bằng vôi bột hoặc một số chế phẩm xử lý đất như Pennac P, EM, Trichoderma... chuẩn bị giống để gieo trồng cho vụ tiếp theo.

Mía: tiếp tục giai đoạn vươn lóng với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25°C, nhiệt độ tuần 03 tháng 10 dao động trong dao động từ 19.4 - 25.0°C,

nhệt độ không khí trung bình 22.2°C, tổng lượng mưa là 446.0mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do lượng mưa tương đối lớn, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh thối đỏ, sâu bốn vạch; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời. Dự báo tuần kế tiếp nhiệt độ có xu hướng tăng trong khi lượng mưa giảm mạnh so với tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh than, sâu mình hồng.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông là loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này. Nhiệt độ trong tuần này dao động từ 19.4 - 25.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.2°C, tổng lượng mưa là 446.0mm; dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp tăng và lượng mưa giảm mạnh, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh thối rễ, côn trùng cánh cứng.

Cây sắn: diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển củ - thu hoạch, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, nền nhiệt tuần này dao động từ 19.4 - 25.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.2°C, tổng lượng mưa là 446.0mm, không thực sự phù hợp cho sắn phát triển bình thường do lượng mưa lớn, có thể gây úng ngập đồng ruộng, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh thối củ sắn, rệp sáp. Đối với phần diện tích sắn bị ngập sâu, khẩn trương thu hoạch sản phẩm ở những ruộng gần đến thời gian thu hoạch hoặc tận thu ở ruộng bị hại nặng. Thực hiện tháo nước nhanh, kịp thời, khơi thông dòng chảy, không để nước ngập lâu trong ruộng gây thối cây, thối củ. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa có xu hướng giảm trong tuần kế tiếp, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh sùng trắng.

Ngô: trong các giai đoạn phát triển khác nhau tùy thuộc vào thời gian gieo trồng trên các diện tích khác nhau: gieo - 7 lá - xoáy nõn - trỗ, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C. Nhiệt độ tuần này dao động từ 19.4 - 25.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.2°C, tổng lượng mưa là 446.0mm, điều kiện thời tiết không thực sự phù hợp cho ngô phát triển. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, một hại thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển trong điều kiện thời tiết này. Dự báo tuần sau lượng mưa giảm mạnh và nhiệt độ tăng so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh ung thư ngô, sâu xanh đục trái.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là cải mơi, cải cúc, cải ngọt, các loại cây họ đậu... Nhiệt độ trung bình tuần này là 22.2 độ C, giảm nhẹ so với tuần trước, nhưng lượng mưa lớn, điều kiện khí hậu không thực sự phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh chết cây con, sâu xanh. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ tăng và lượng mưa có xu hướng giảm mạnh (300mm), cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: sâu xanh, sâu cuốn lá. Riêng phần diện tích hoa màu bị ngập sâu: Với ruộng ngập thời gian ngắn và cây rau còn nhỏ có khả năng phục hồi cần phun các loại

thuốc phòng trừ nấm hại như: Anvil, Ridomil, Oxyclorea đồng... để phòng trừ nấm lở cổ rễ; kết hợp chế phẩm KH, Pennac P, siêu lân..., chăm sóc bổ sung, bón thêm phân khi thời tiết thuận lợi giúp cây nhanh phục hồi; Đối với những diện tích bị ảnh hưởng nặng, không có khả năng cho thu hoạch cần vệ sinh đồng ruộng, chủ động chuẩn bị đất để gieo trồng lại.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh): đang giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ tuần dao động từ 19.4 - 25.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.2°C, tổng lượng mưa là 446.0mm, chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh đốm đen, bọ xít xanh. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo giảm mạnh; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ nám, bệnh loét. Đối với phần diện tích cây ăn quả bị ngập, cần thoát nước nhanh trong vườn, cắt bỏ những cành gãy, cành bị tổn thương nặng, xới mặt đất để phá váng khi đất đã se mặt, giúp đất được thông thoáng, cung cấp các dưỡng chất qua lá (phân bón lá Yogen; phân bón lá đầu trâu) ... để tăng cường khả năng hồi phục của cây.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 18.7 - 26.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.5°C, tổng lượng mưa là 161.6mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng nhẹ, lượng mưa giảm đáng kể, người dân nhanh chóng tháo nước khỏi đồng ruộng còn đọng nước, sử dụng các biện pháp phù hợp để cải tạo, vệ sinh diện tích đất đã bị úng ngập trước khi trồng cây mới, phục hồi tối đa diện tích cây trồng có khả năng tiếp tục phát triển sau khi nước rút.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyền

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng