

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
Tuần 3 tháng 6 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 6 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 27.4 - 36.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.9°C, tổng lượng mưa là 53.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:

Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.3^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.6^\circ\text{C}$.

Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 29.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 17.9\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 10.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 14.4\text{mm}$.

* Một số lưu ý thời tiết tuần tới: Từ đêm 02 đến ngày 12/7/2020, chiều tối và đêm 02-04/7 vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	35.9	26.9	31.4	83.4
Trong tuần	36.4	27.4	31.9	53.8
Tuần tới	35.8	30.5	33.1	43.3

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 03 tháng 6 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa: Lúa hè thu đang trong giai đoạn làm đòng, lúa mùa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn này là 25-32°C, nhiệt độ trên 38°C sẽ không thuận lợi cho quá trình đẻ nhánh. Nền nhiệt độ tuần này và tuần tới tương đối cao, nhiệt độ trung bình tuần này là 31.9°C, trong khi lượng mưa tuần này giảm so với tuần trước, quan đó có thể nhận thấy điều kiện thời tiết tuần này không thực sự thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa hè thu trong khu vực. Cần lưu ý một số sâu bệnh chính giai đoạn này là: bệnh bọ trĩ, ốc brou vàng. Với số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp tăng nhẹ và lượng mưa có xu thế giảm, tuy nhiên biến động không nhiều, do đó cần tiếp tục lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong tuần kế tiếp: bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bọ trĩ và chuột.

Mía: tiếp tục phát triển làm đóng và vươn cao, nhiệt độ tốt nhất là 30-32°C, nhiệt độ tuần 3 tháng 6 dao động trong khoảng 27.4 - 36.4°C và tổng lượng mưa là 53.8mm, có thể nhận thấy nhiệt độ tuần này thích hợp cho mía phát triển. Tuy nhiên, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh trắng lá, sâu non bọ hung, cần phát hiện và phòng trừ kịp thời. Dự báo tuần tới nhiệt độ tăng nhẹ so với tuần này, dao động từ 30.5 - 35.8°C, lượng mưa giảm so với tuần này khoảng 10mm, do đó, người dân cần đảm bảo đủ nước cho mía và chú ý một số sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết này: bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ.

Lạc xuân: Phần lớn diện tích lạc đã thu hoạch xong, ruộng lạc trong thời kỳ kiến thiết cơ bản sau thu hoạch. Tuần này có nhiệt độ dao động 27.4 - 36.4°C, nền nhiệt độ tương đối cao (trung bình 31.9°C), thời tiết nắng ráo thích hợp cho quá trình cải tạo đất trồng. Dự báo tuần tới nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa giảm, thích hợp cho quá trình làm đất trên diện tích trồng lạc đã thu hoạch trong khu vực.

Sắn: Đang trong giai đoạn phát triển củ và thu hoạch, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, nền nhiệt tuần dao động trong khoảng 27.4 - 36.4°C phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số sâu bệnh chủ yếu: bệnh thối củ và bệnh khảm

lá sắn. Theo dự báo nhiệt độ tuần sau tăng nhẹ, lượng mưa giảm phù hợp cho quá trình thu hoạch sắn trên các diện tích cây trồng trong khu vực; cần tiếp tục lưu ý bệnh thối củ và khảm lá sắn.

Ngô xuân: Vẫn tiếp tục phát triển ở các giai đoạn xoáy nõn nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C, nhiệt độ thấp có ảnh hưởng xấu đến quá trình tung phấn, phun râu thụ tinh, nhiệt độ trên 35°C hạt phấn dễ bị chết, ở giai đoạn này cây ngô cần nhiều nước. Nhiệt độ tuần này dao động trong khoảng 27.4 - 36.4°C với lượng mưa tổng trên 50mm, phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô. Cần lưu ý bệnh hại hạt và bệnh phấn đen thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần sau lượng mưa giảm không đáng kể với nhiệt độ tăng nhẹ, do đó người dân cần lưu ý cung cấp đủ nước cho ngô và chú ý bệnh sâu keo mùa thu.

Rau màu: Đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc các khu vực gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Diện tích bí đã thu hoạch trên hầu hết diện tích gieo trồng trong khu vực. Nhiệt độ trung bình tuần này là 31.9 độ C, tăng không đáng kể so với tuần trước, thích hợp cho các loại dưa trồng trong vùng. Cần lưu ý một số loài sâu bệnh: sâu vẽ bùa, bệnh phấn trắng. Theo dự báo tuần kế tiếp nhiệt độ và lượng mưa không thay đổi nhiều, cần lưu ý một số bệnh trên rau màu như: bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang, bọ trĩ.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh): Đang trong giai đoạn quả non phát triển. Nhiệt độ tuần dao động từ 27.4 - 36.4°C, với lượng mưa trên 50mm phù hợp giai đoạn phát triển quả non trên cây có múi. Nhiệt độ dự báo tuần kế tiếp có xu hướng tăng nhẹ, trong khi lượng mưa giảm không đáng kể, thời tiết khô ráo tuy nhiên cần lưu ý một số loại sâu bệnh chính như: bệnh loét, bệnh sẹo, bệnh rụng quả.

Thống kê Bảng 1 cho thấy tuần tới nhiệt độ dao động trong khoảng 30.5 đến 35.8°C, nhiệt độ trung bình 33.1°C và lượng mưa dự báo giảm xuống 43.3mm; cần chú ý lựa chọn các biện pháp chống nắng phù hợp và cung cấp đầy đủ nước cho cây trồng, đồng thời phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN




Nguyễn Văn Nhật

KIỂM SOÁT




Phạm Thị Kim Phụng


Xu thế nhiệt độ không khí tối cao



Xu thế nhiệt độ không khí tối thấp



Xu thế nhiệt độ không khí trung bình



Xu thế tổng lượng mưa

