



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
Tuần 2 tháng 7 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 7 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 28.4 - 35.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 32.0°C, tổng lượng mưa là 16.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 60.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 5.4 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5.2 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-22/7 và từ ngày 29-31/7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 23-28/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	36.4	28.4	32.4	77.0
Trong tuần	35.6	28.4	32.0	16.3
Tuần tới	36.4	30.8	33.6	15.7

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 7 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa: đang trong giai đoạn làm đòng - trỗ với lúa hè thu sớm, nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn này là 25-32°C; và giai đoạn 8 lá - trỗ cò với lúa chính vụ, nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển là 25-30°C; nền nhiệt độ tuần này và tuần tới tương đối cao, nhiệt độ trung bình tuần này là 32.0°C, lượng mưa tuần này giảm mạnh so với tuần trước, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết tuần này không thực sự thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần lưu ý sâu bệnh chính giai đoạn này là: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân. Với số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp tăng nhẹ (khoảng 1.5 độ C) và lượng mưa thay đổi không nhiều, do đó cần tiếp tục lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong tuần kế tiếp: bệnh hại lúa, rầy nâu.

Mía: tiếp tục giai đoạn vươn lóng, nhiệt độ tốt nhất là 30-32°C, nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 7 dao động từ 28.4 - 35.6°C, trung bình 32.0°C, tổng lượng mưa là 16.3mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này thích hợp cho mía phát triển. Tuy nhiên, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như bọ hung đen, sâu đục thân mình tím, cần phát hiện và phòng trừ kịp thời. Dự báo tuần tới nhiệt độ tăng nhẹ so với tuần này, dao động từ 30.8 - 36.4°C, lượng mưa giảm, do đó người dân cần đảm bảo đủ nước cho mía và chú ý một số sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết này: bệnh than, bệnh thối đờ.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông là loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá

cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này. Theo thống kê nhiệt độ tuần này dao động trong khoảng 28.4 - 35.6°C; lượng mưa khoảng 16.3mm và dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng nhẹ, lượng mưa có xu thế giảm; cần lưu ý một số loại bệnh: bệnh khô lá thông, bệnh thối củ rễ.

Sắn: đang trong giai đoạn phát triển củ và thu hoạch, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, nền nhiệt tuần dao động trong khoảng 28.4 - 35.6°C phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số sâu bệnh chủ yếu: rệp sáp bột hồng, thối củ. Theo dự báo nhiệt độ tuần sau tăng nhẹ, lượng mưa giảm phù hợp cho quá trình thu hoạch sắn trên các diện tích cây trồng trong khu vực; cần tiếp tục lưu ý bệnh thối củ và khảm lá sắn.

Ngô xuân: ở các giai đoạn phát triển thân lá, trổ cờ, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C, nhiệt độ thấp có ảnh hưởng xấu đến quá trình phun râu thụ tinh, nhiệt độ trên 35°C hạt phấn dễ bị chết, ở giai đoạn này cây ngô cần nhiều nước. Nhiệt độ tuần này dao động trong khoảng 28.4 - 35.4°C, với lượng mưa tương đối thấp 16.3mm, do đó người dân cần lưu ý đảm bảo cung cấp đủ nước cho ngô. Cần lưu ý sâu xám và sâu cắn lá thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần sau lượng mưa giảm nhẹ và nhiệt độ tăng so với tuần này, do đó người dân cần lưu ý cung cấp đủ nước cho ngô và tiếp tục chú ý bệnh thối thân và khô vằn.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc các khu vực gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là bí đỏ, bí xanh, mồng tơi... Nhiệt độ trung bình tuần này là 32.0 độ C, giảm nhẹ so với tuần trước, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần lưu ý một số loài sâu bệnh: sâu khoang, sâu tơ. Theo dự báo tuần kế tiếp nhiệt độ tăng (trên 1 độ C), lượng mưa giảm tương đối nhiều, cần lưu ý cần lưu ý có biện pháp che chắn và cung cấp đủ nước cho rau màu, đồng thời, phòng trừ một số bệnh trên rau màu như: sâu xanh, nhện đỏ.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh): tiếp tục trong giai đoạn phát triển quả. Nhiệt độ tuần dao động từ 28.4 - 35.6°C, với lượng mưa 16.3mm phù hợp giai đoạn phát triển quả non trên cây có múi. Nhiệt độ dự báo tuần kế tiếp có xu hướng tăng nhẹ, trong khi lượng mưa giảm không đáng kể, cần lưu ý cung cấp đủ nước cho cây ăn quả và một số loại sâu bệnh chính như: bệnh vàng lá, bệnh cháy gôm.


Thống kê Bảng 1 cho thấy tuần tới nhiệt độ dao động trong khoảng 30.8 đến 36.4°C, nhiệt độ trung bình 33.6°C và lượng mưa dự báo là 15.7mm; cần chú ý lựa chọn các biện pháp chống nắng phù hợp và cung cấp đầy đủ nước cho cây trồng, đồng thời phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Văn Nhật

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng