



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 7 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 7 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 27.9 - 35.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.5°C, tổng lượng mưa là 58.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.2^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.7^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 42.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 18.6 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 43.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ 12-15/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 16-19/7 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 20-22/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Theo nguồn Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	36.1	27.3	31.7	16.5
Trong tuần	35.1	27.9	31.5	58.9
Tuần tới	37.3	32.1	34.7	15.1

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 7 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây lúa: diện tích lúa mùa và lúa mùa sớm khu vực đang trong giai đoạn hồi xanh đẻ nhanh và đẻ rộ; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 27.9 - 35.1°C, có thể nhận thấy nền nhiệt độ tuần này tương đối cao, bất lợi cho giai đoạn phát triển của lúa mùa. Điều kiện thời tiết tuần này cũng phù hợp với một số đối tượng sinh vật phát triển gây hại cho lúa, đặc biệt là bệnh lùn xoắn lá, rầy nâu, sâu cuốn lá, người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phun thuốc kịp thời các diện tích lúa bị nhiễm bệnh. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tối cao tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa giảm đáng kể trong tuần, có thể nhận thấy điều kiện

nhật độ dự báo tuần tới không phù hợp giai đoạn phát triển của lúa hè thu, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của lúa giai đoạn làm đòng, đồng thời cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn và chuột.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, điều kiện khí tượng tuần này mưa giảm so với tuần trước, tổng lượng mưa là 15.1mm, nhiệt độ tương đối cao trong khoảng từ 27.9°C đến 35.1°C, không thật sự có lợi cho giai đoạn này của cây ăn quả, do đó người dân cần đảm bảo đủ nước cho cây trồng trong khu vực. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần lưu ý các loại bệnh như bệnh loét, bệnh vàng lá, có thể áp dụng phương pháp loại bỏ cành sâu bệnh, dùng thuốc trừ sâu bệnh. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 34.7°C, đồng thời lượng mưa giảm, là điều kiện một số sâu bệnh phát triển như: bọ xít xanh, sâu vẽ bùa, sâu đục thân.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô đang trong giai đoạn phát triển thân lá; thời tiết tuần này có nhiệt độ trung bình 31.5°C, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; một số bệnh phổ biến: rỉ sắt, sợi đen, đốm lá. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế tăng (trên 2 độ C) trong khi lượng mưa giảm mạnh, do đó lưu ý bệnh sâu đục thân và sâu cắn lá tiếp tục phát sinh gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con và sinh trưởng.

Cây nhãn: Giai đoạn tuần 1 tháng 7, nhãn tiếp tục giai đoạn thu hoạch. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 1 tháng 7 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 27.9 - 35.1°C và lượng mưa là 58.9mm, phù hợp cho nhãn phát triển quả và thu hoạch. Tuy nhiên cần lưu ý bệnh bọ xít nâu và sâu đục cuống quả trong giai đoạn này. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Diện tích nhãn các tỉnh trong khu vực đã bước vào thu hoạch mạnh, riêng nhãn lồng thu hoạch muộn hơn, theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp tăng nhiều và lượng mưa giảm đáng kể so với tuần này, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như sâu đục thân, sâu đục cành, sâu đục gốc và chổi rồng.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp và thu hái búp, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, nhiệt độ trong tuần này tương đối cao, dao động từ 27.9 - 35.1°C, khoảng nhiệt độ phù hợp với quá trình phát triển của chè, lượng mưa tuần này

cũng tương đối đủ nước cho chè phát triển. Tuy nhiên, theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng trong khi lượng mưa có xu hướng giảm, do đó, lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh mạnh như bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh phòng lá chè.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 1 tháng 7 có nền nhiệt độ tương đối cao, dao động từ 27.9 - 35.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.5°C, do đó trong quá trình chăm sóc bón phân cần bón sâu để hạn chế bay hơi, cần lưu ý bệnh nhện đỏ, sâu vẽ bùa trên các loại rau màu trong khu vực. Dự báo tuần tới nhiệt độ có xu hướng tiếp tục tăng, cần lưu ý một số bệnh có khả năng phát sinh như bệnh xoắn lá, bệnh sương mai.


Số liệu tổng hợp tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 32.1 - 37.3°C, nhiệt độ dự báo trung bình dự báo cao 34.7°C, lượng mưa dự báo tuần kế tiếp giảm còn trên 15mm, do đó các cây trồng cần được chú ý biện pháp chống nắng thích hợp, phòng chống dịch bệnh phát triển trên nền nhiệt cao hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng