



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 8 năm 2020

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 8 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 26.8 - 34.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.5°C, tổng lượng mưa là 76.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.9^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.9^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 32.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 24.7$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 37.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 6.6$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 02/8-12/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm DBKTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	33.0	27.1	30.0	108.8
Trong tuần	34.2	26.8	30.5	76.1
Tuần tới	34.7	29.5	32.1	39.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 8 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa: hè thu trong giai đoạn chín và thu hoạch, thời kỳ này yêu cầu nhiệt độ tốt nhất từ 28-30°C. Lúa mùa sớm và chính vụ giai đoạn đòng - trổ và chín với nhiệt độ thích hợp là 25-32°C. Lúa muộn đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái - đòng với nhiệt độ thích hợp là 25-32°C. Tuần này nhiệt độ dao động từ 26.8 - 34.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.5°C, tổng lượng mưa là 76.1mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần giảm khá nhiều so với tuần trước, điều kiện thời tiết tuần này không thực sự thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần lưu ý sâu bệnh chính là: rầy nâu, sâu đục thân hai chấm. Với số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp tăng trong khi lượng mưa giảm (tổng lượng mưa dự báo gần 40mm), do đó cần chú ý cung cấp đủ nước cho cây trồng, lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong tuần kế tiếp: bệnh khô vằn, bọ trĩ.

Mía: tiếp tục giai đoạn cây con - vươn lóng với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25°C, nhiệt độ tuần 3 tháng 8 dao động trong dao động 26.8 - 34.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.5°C, tổng lượng mưa là 76.1mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển nên nhiệt

tương đối cao, cần lưu ý một số loại bệnh chủ yếu như bệnh than, bệnh thối đỏ, khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời. Dự báo tuần sau nhiệt độ tăng nhẹ so với tuần này, dao động từ 29.5- 34.7°C, lượng mưa giảm đáng kể, cần lưu ý cung cấp đủ nước cho cây trồng và chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết này: sâu non bọ hung, bệnh xoắn cổ lá.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.8- 34.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.5°C, tổng lượng mưa là 76.1mm và dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng đồng thời lượng mưa có xu thế giảm đáng kể; cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh thối cổ lá, bọ hung non.

Sắn: diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển củ và thu hoạch, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, nền nhiệt tuần dao động trọng khoảng 26.8 - 34.2°C phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý bệnh thối củ sắn, khảm lá do virus. Theo dự báo nhiệt độ tuần sau tăng và lượng mưa giảm đáng kể, do đó cần kiểm tra đồng ruộng, đảm bảo đủ nước cho giai đoạn phát triển này của sắn; cần tiếp tục lưu ý rệp sáp bột hồng hại sắn.

Ngô: trong giai đoạn tiếp tục giai đoạn xoáy nõn - trổ, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C. Nhiệt độ tuần này dao động từ 26.8 - 34.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.5°C, tổng lượng mưa là 76.1mm. Người dân cần lưu ý bệnh gỉ sắt, bệnh héo cây ngô thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần tới lượng mưa giảm mạnh và nhiệt độ tăng so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý bệnh đốm lá lớn ở ngô.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là dưa hấu, đậu bắp, lơ xanh sớm... Nhiệt độ trung bình tuần này là 30.5°C, tăng nhẹ so với tuần trước, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh thối nhũn, bệnh sương mai. Theo dự báo tuần kế tiếp nhiệt độ tăng (hơn 2°C), lượng mưa giảm mạnh (khoảng 40mm), cần lưu ý một số loại sâu trên rau màu như: bọ nhảy, sâu xanh.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh): giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ dự báo tuần kế tiếp có xu hướng tăng, trong khi lượng mưa dự báo giảm đáng kể, cần

lưu ý cung cấp đủ nước cho cây ăn quả và một số loại bệnh như: bệnh vàng lá, bệnh thối rễ.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 29.5 - 34.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 32.1°C, tổng lượng mưa là 39mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý cung cấp nước đầy đủ, có biện pháp chăm sóc cây và phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**