



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 8 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 8 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 24.3 - 30.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.6°C, tổng lượng mưa là 66.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.3^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 249.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 22.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 28.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 6.1 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-10/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Từ 11-12/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm DBKTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.1	23.5	25.8	315.7
Trong tuần	30.8	24.3	27.6	66.5
Tuần tới	33.6	29.4	31.5	38.4

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 8 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây lúa: Lúa mùa trong khu vực đang ở giai đoạn trổ - ngâm sữa, chắc xanh, điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là 28-30°C. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 24.3 - 30.8°C, trung bình 27.6°C, tổng lượng mưa là 66.5mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm, trong tuần tới cần lưu ý một số bệnh có khả năng gây hại: bệnh khô vằn, bệnh bạc lá.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn chăm sóc, phát triển lộc. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, dao động từ 24.3 - 30.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.6°C, tổng lượng mưa là 66.5mm, phù hợp cho giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi và phát triển lộc trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý nhện lông nhung, bệnh chết rũ cây. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng, trong khi lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp quá trình bón phân, tia cành cho diện tích vải đã thu hoạch, đang trong giai đoạn cải tạo và phục hồi đất.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả và thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, điều kiện khí tượng tuần này dao động từ 24.3 - 30.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.6°C, tổng lượng mưa là 66.5mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh vàng lá, sâu vẽ bùa; khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 31.5 độ C, đồng thời lượng mưa dự báo giảm (khoảng 40mm) là điều kiện một số sâu bệnh phát triển như: sâu đục cành, bệnh chảy gôm.

Cây ngô: Ngô hè thu giai đoạn phát triển bắp và thu hoạch; nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C và thích hợp nhất từ 25-28°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 24.3 - 30.8°C không thật sự phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần lưu ý một số bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh đốm lá nhỏ, bệnh héo cây ngô, cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa có xu thế giảm với tổng lượng mưa khoảng 40mm, do đó cần chú ý kiểm tra đồng ruộng, đảm bảo cung cấp nước kịp thời và chống nắng cho cây trồng.

Cây rau màu: các loại rau màu đang trong các giai đoạn cây con, phát triển thân lá và thu hoạch tùy thuộc vào diện tích gieo trồng khác nhau, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, tuần này nhiệt độ dao động từ 24.3 - 30.8°C, nên nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bọ nhậy, đốm lá. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 31.5°C và lượng mưa giảm, có thể nhận định điều kiện thời tiết tuần sau không thuận lợi cho sự phát triển một số loại rau màu nhất là các loại rau chịu nóng kém; đồng thời lưu ý bệnh lở cổ rễ, bệnh chết cây con có thể phát triển nhẹ trong tuần tới.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 29.4 - 33.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.5°C, tổng lượng mưa là 38.4mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm so với tuần này các cây trồng cần được chú ý chăm sóc phù hợp với điều kiện thời tiết và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng