



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 7 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 7 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 27.0 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng mưa là 60.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.3^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 46.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 20.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 102.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 11.9 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Đêm 02/8 có mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 03/-07/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 08-12/8, có mưa rào và dông vài nơi. (Nguồn: Trung tâm DBKTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	35.1	27.8	31.4	14.1
Trong tuần	34.5	27.0	30.8	60.8
Tuần tới	33.4	26.2	29.8	163.5

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 7 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây lúa: theo thống kê diện tích lúa mùa và lúa mùa sớm khu vực đang trong giai đoạn trổ, phơi màu; lúa chính vụ giai đoạn đẻ nhánh, phân hoá đòng; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 25-32°C, nhiệt độ tuần này dao động từ 27.0 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, tổng lượng mưa là 60.8mm, có thể nhận thấy thời tiết phù hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Điều kiện thời tiết tuần này cũng phù hợp với một số đối tượng sinh vật phát triển gây hại cho lúa như: rầy nâu, sâu đục thân, người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phun thuốc kịp thời các diện tích lúa bị nhiễm bệnh. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ trung bình tuần kế tiếp có xu hướng giảm, lượng mưa có xu hướng tăng trong tuần tới, có thể nhận thấy điều kiện nhiệt độ dự báo tuần tới không thật sự phù hợp giai đoạn phát triển của lúa hè thu, lượng mưa lớn có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh

trưởng và phát triển của lúa giai đoạn làm đòng, đồng thời cần lưu ý một số loại sâu bệnh khô vằn, bệnh bạc lá.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, điều kiện khí tượng tuần này mưa tăng so với tuần trước, tổng lượng mưa là 60.8mm, nhiệt độ trong khoảng từ 27.0°C đến 34.5°C, tương đối có lợi cho giai đoạn này của cây ăn quả. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần lưu ý các loại sâu bệnh vàng lá, bệnh thối rễ. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình giảm xuống 29.8 độ C, lượng mưa tăng khoảng 100mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: sâu vẽ bùa, bọ xít xanh.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô đang trong giai đoạn phát triển phát triển bắp - thu hoạch; thời tiết tuần này có nhiệt độ trung bình 30.8°C, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; một số bệnh phổ biến: sâu xám, rệp muội. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế giảm nhẹ (trên 1 độ C) trong khi tổng lượng mưa dự báo có xu thế tăng đáng kể, cần lưu ý một số bệnh: bệnh bạch tạng, bệnh cháy lá.

Cây nhãn: Giai đoạn tuần 3 tháng 7 hầu hết diện tích trồng nhãn trong giai đoạn thu hoạch mạnh. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 3 tháng 7 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 27.0 - 34.5°C và lượng mưa là 60.8mm, phù hợp cho nhãn phát triển quả và thu hoạch. Cần lưu ý bệnh sâu đục cuống quả, rệp hại nhãn trong giai đoạn này. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp giảm cùng với lượng mưa tăng đáng kể là điều kiện thích hợp cho giai đoạn kế tiếp của nhãn trong tuần tới, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như sương mai trên nhãn, ghẻ cành, thán thư.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp và thu hái búp, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, nhiệt độ trong tuần dao động từ 27.0 - 34.5°C, khoảng nhiệt độ phù hợp với quá trình phát triển của chè. Tuy nhiên, theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ giảm nhẹ đồng thời lượng mưa có xu hướng tăng (khoảng 100mm), là điều kiện cho một số sâu bệnh có khả năng phát sinh mạnh như sâu chùm, bọ net, mối hại chè.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 3 tháng 7 có nền nhiệt độ dao động từ 27.0 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.8°C, do đó trong quá trình chăm sóc bón phân cần bón sâu để hạn chế bay hơi, cần lưu ý sâu xanh, nhện đỏ, sâu khoang trên các loại rau màu trong khu vực. Dự báo tuần tới lượng mưa có xu hướng tăng

đáng kể, cần lưu ý một số bệnh có khả năng phát sinh như bệnh sương mai, bệnh phấn trắng.


Số liệu tổng hợp tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 26.2 - 33.4°C, nhiệt độ dự báo trung bình khoảng 29.8°C, lượng mưa dự báo tuần kế tiếp tăng mạnh 163.5mm, do đó, các cây trồng cần được chú ý biện pháp tiêu thoát nước thích hợp đồng thời phòng chống dịch bệnh phát triển trên trong điều kiện không khí ẩm, mưa nhiều một cách hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng