



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 3 tháng 8 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 8 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 22.7 - 30°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.4°C, tổng lượng mưa là 79.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.3^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.7^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 136.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 25.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 22.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 9.6 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ 02-06/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 05/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, từ ngày 03-05/9 có nắng nóng; Từ đêm 06-10/9, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ 11-12/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.9	22.4	25.6	216.5
Trong tuần	30.0	22.7	26.4	79.9
Tuần tới	31.4	25.9	28.6	57.6

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 3 tháng 8 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây lúa: lúa mùa sớm đang trong giai đoạn trổ - ngâm sữa - chắc xanh, lúa mùa chính vụ - muộng đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng - trổ, lúa nương - lúa 1 vụ đang trong giai đoạn chắc xanh-chín, thu hoạch. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng $22.7 - 30.0^{\circ}\text{C}$, khoảng nhiệt độ khá thích hợp cho cây lúa sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên lượng mưa của khu vực không đáng nhiều 79.9mm khiến nhiều diện tích lúa bị thiếu nước. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh nằm trong khoảng $25.9 - 31.4^{\circ}\text{C}$ và tổng lượng mưa khu vực không đáng kể khoảng 57.6mm. Vì vậy trong quá trình chăm sóc cần đặc biệt lưu ý bảo đảm bổ sung đủ nguồn nước và phân bón cho cây lúa trong thời kỳ này, ở những khu vực điều kiện thủy lợi cho phép cần duy trì mực nước trong ruộng khoảng 5 cm. Đồng thời cần lưu ý một số đối tượng sinh vật hại: Sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, sâu đục thân 2 chấm, bệnh lùn sọc đen, bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn, chuột, bệnh vàng lá di động...tiếp tục gia tăng gây hại.

Cây ngô: cây ngô đang trong giai đoạn phát triển bắp - thu hoạch. Ngô là loại cây rất mẫn cảm với nước. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng

22.7 -30.0⁰C, khoảng nhiệt độ khá thích hợp cho cây ngô sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên lượng mưa của khu vực không nhiều 79.9mm dẫn đến một số diện tích ngô bị khô hạn. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh nằm trong khoảng 25.9-31.4⁰C và tổng lượng mưa khu vực không đáng kể khoảng 57.6mm. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc cần lưu ý bổ sung nước kịp thời cho cây ngô phát triển, nhất là đối với diện tích ngô đang trong giai đoạn phát triển bắp, đối với các diện tích ngô đang trong giai đoạn thu hoạch, cần tranh thủ những ngày thời tiết nắng ráo thu hoạch. Đồng thời, cần lưu ý các đối tượng sâu bệnh gây hại chủ yếu như: sâu keo mùa thu, chuột, sâu cắn lá, sâu xám, bệnh khô vằn, sâu đục thân, bệnh đốm lá lớn, bệnh đốm lá nhỏ.

Cây lạc vụ xuân hè: đang trong giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ 24 - 33⁰C. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 22.7 -30.0⁰C, khoảng nhiệt độ rất thích hợp cho cây lạc sinh trưởng và phát triển. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh nằm trong khoảng 25.9-31.4⁰C và tổng lượng mưa khu vực không đáng kể khoảng 57.6mm. Đối với các diện tích lạc đang trong giai đoạn thu hoạch, người dân cần tranh thủ những ngày thời tiết nắng ráo để thu hoạch và dọn ruộng, đối với các diện tích lạc đang trong giai đoạn phát triển củ cần lưu ý bảo đảm đủ độ ẩm cho đất giúp cây lạc sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời cần lưu ý các đối tượng bệnh lở cổ rễ, chuột, kiến... gây hại.

Cây ăn quả có múi (cam Hòa Bình): đang trong giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 22.7 -30.0⁰C, khoảng nhiệt độ khá thích hợp cho cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh nằm trong khoảng 25.9-31.4⁰C và tổng lượng mưa khu vực không đáng kể khoảng 57.6mm. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc cần lưu ý bổ sung đủ nguồn nước cho cây, thường xuyên tỉa cành loại bỏ cành sâu bệnh, cành già cỗi, cành kém phát triển, đồng thời lưu ý một số sâu bệnh gây hại: ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp, sâu vẽ bùa, tiếp tục hại tăng; bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh vàng lá thối rễ tiếp tục phát sinh gây hại.

Mận Sơn La: đang trong giai đoạn cuối thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 22.7 -30.0⁰C, khoảng nhiệt độ thích hợp cho cây mận sinh trưởng và phát triển. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh nằm trong khoảng 25.9-31.4⁰C và tổng lượng mưa khu vực không đáng kể khoảng 57.6mm. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc cần bổ sung thêm nguồn nước cho cây mận sinh trưởng và phát triển. Đối với các diện tích đã cho thu hoạch xong cần lưu ý tỉa bỏ các lá, cành sâu bệnh, cành tăm hương để cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh có chỗ trú ngụ, đồng thời lưu ý các đối tượng sâu bệnh bệnh chảy gôm, bệnh khô cành, sâu đục cành, sâu đục thân,... gây hại.

Cây rau màu: đang trong các giai đoạn cây con – phát triển thân lá – thu hoạch. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 22.7 -30.0⁰C, khoảng nhiệt độ tương đối thích hợp cho cây rau màu sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên lượng mưa

của khu vực không nhiều 79.9mm khiến nhiều diện tích cây rau màu bị thiếu nước . Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh nằm trong khoảng 25.9-31.4⁰C và tổng lượng mưa khu vực không đáng kể khoảng 57.6mm. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc cần lưu ý bổ sung thêm nguồn nước, phân bón và chủ động các biện pháp chống nắng nóng cho cây. Đồng thời, cần lưu ý các đối tượng sinh vật hại: sâu tơ, sâu xanh, bọ nhày, sâu khoang, ruồi đục lá, bệnh phấn trắng, bọ trĩ, nhện đỏ...phát sinh gây hại nhẹ; bệnh xoắn lá virus tiếp tục gây hại trên cây cà chua.

Cây chè (chè Shan tuyết – Lai Châu): đang trong giai đoạn phát triển búp và thu hái búp, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó, ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 22.7 -30.0⁰C khoảng nhiệt độ khá thích hợp cho cây chè sinh trưởng và phát triển. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh nằm trong khoảng 25.9-31.4⁰C, tổng lượng mưa khu vực 57.6mm, khoảng nhiệt độ khá thích hợp cho cây chè sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên cần lưu ý bổ sung thêm nguồn nước cho cây chè do lượng mưa của khu vực không đáng kể. Đồng thời lưu ý một số đối tượng sâu bệnh như rầy xanh, bệnh thối búp chè, bệnh phòng lá, nhện gié,...

Cây hồi: vườn kiến thiết đang trong giai đoạn phát triển thân lá, vườn kinh doanh đang trong giai đoạn thu hoạch. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 22.7 -30.0⁰C, khoảng nhiệt độ khá thích hợp cho cây hồi sinh trưởng và phát triển. Tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh nằm trong khoảng 25.9-31.4⁰C và tổng lượng mưa khu vực không đáng kể khoảng 57.6mm. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc cần lưu ý bổ sung thêm nguồn nước cho cây, tía bỏ các cành già, cành sinh trưởng kém, cây cụt ngọn không đáp ứng được mục đích kinh doanh đồng thời thực hiện việc chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại theo quy trình kỹ thuật.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 25.9 - 31.4⁰C, nhiệt độ không khí trung bình 28.6⁰C, tổng lượng mưa là 57.6mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tăng mạnh, mưa không đáng kể, các cây trồng cần được chú ý bảo đảm đủ nguồn nước, dinh dưỡng và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng