



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 1 tháng 9 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 9 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 24.4 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.9°C, tổng lượng mưa là 92.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 25.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 28.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 25.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 14.8 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 12-17/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối và đêm 17-18/9, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Ngày 19/9 có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 20-22/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm DBKTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	30.8	24.3	27.6	66.5
Trong tuần	29.4	24.4	26.9	92.4
Tuần tới	29.7	27.1	28.4	66.8

II. Đặc trưng nông nghiệp

Cây lúa: lúa mùa trong khu vực đang ở giai đoạn ngâm sữa, chắc xanh, điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là $28-30^{\circ}\text{C}$. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ $24.4 - 29.4^{\circ}\text{C}$, trung bình 26.9°C , tổng lượng mưa là 92.4mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh bạc lá, rầy nâu, người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm đáng kể, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: sâu cuốn lá nhỏ, bệnh cháy bìa lá.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển lộc. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, dao động từ $24.4 - 29.4^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 26.9°C , tổng lượng mưa là 92.4mm, phù hợp cho giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi và phát triển lộc trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý bọ xít nâu, bệnh sương mai. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng, trong khi lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm mạnh, do đó cần chú ý đảm bảo nước cho cây trồng.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả và thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, điều kiện khí tượng tuần này dao động từ 24.4 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.9°C, tổng lượng mưa là 92.4mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh thán thư, bệnh đốm đen; khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng, đồng thời lượng mưa dự báo giảm (khoảng 30mm), cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh vàng lá, sâu đục cành.

Cây ngô: Ngô hè thu giai đoạn phát triển bắp và thu hoạch, nhiệt độ thích hợp nhất từ 25-28°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 24.4 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.9°C, tổng lượng mưa là 92.4mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: sâu xám, sâu đục bắp, cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa có xu thế giảm với tổng lượng mưa khoảng 30mm, do đó cần chú ý kiểm tra đồng ruộng, đảm bảo cung cấp nước kịp thời và chống nắng cho cây trồng.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn cây con, phát triển thân lá và thu hoạch tùy thuộc vào diện tích gieo trồng khác nhau, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, tuần này nhiệt độ dao động từ 24.4 - 29.4°C, nền nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh vàng lá, bệnh thối nhũn. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 28.4°C và lượng mưa giảm, có thể nhận định điều kiện thời tiết tuần sau không thuận lợi cho sự phát triển một số loại rau màu nhất là các loại rau chịu nóng kém; đồng thời lưu ý một số loại sâu: sâu khoang, nhện đỏ có thể phát triển nhẹ trong tuần tới.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 27.1 - 29.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.4°C, tổng lượng mưa là 66.8mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm so với tuần này, các cây trồng cần được chú ý chăm sóc phù hợp với điều kiện thời tiết và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng