



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC ĐÔNG BẮC
Tuần 2 tháng 9 năm 2020**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 9 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 22.4 - 26.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.5°C, tổng lượng mưa là 189.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.8^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 377.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 57.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 101.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 17.6 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 24-25/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 24/9 có mưa rào và dông rải rác, đêm 25/9 khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 26-27/9, có mưa rào và rải rác có dông (mưa tập trung chính vào ban đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 27/9-02/10 đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng đêm 29/9 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.4	24.4	26.9	567.4
Trong tuần	26.7	22.4	24.5	189.7
Tuần tới	29.4	26.8	28.1	88.4

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 9 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây lúa mùa trong khu vực đang ở giai đoạn chắc xanh – chín, điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là 28-30°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh, làm đòng của cây lúa. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 22.4 - 26.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.5°C, tổng lượng mưa là 189.7mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh thối gốc, bệnh thối đen lép lửng, sâu cuốn lá lớn, người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm đáng kể, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: sâu đục thân hai chấm, bệnh vân nâu lá lúa.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển lộc. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, dao động từ 22.4 - 26.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.5°C, tổng lượng mưa là 189.7mm, phù hợp cho giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi và phát triển lộc trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý nhện lông nhung, bệnh chết rũ cây. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng, trong khi lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm mạnh (100mm), do đó cần chú ý đảm bảo nước cho cây trồng.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả và thu hoạch. Điều kiện khí tượng tuần này dao động từ 22.4 - 26.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.5°C, tổng lượng mưa là 189.7mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh vàng lá gân xanh, bệnh loét; khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 28.1 độ C, đồng thời lượng mưa dự báo giảm (khoảng 100mm), cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh ghẻ nhám, rệp sáp, bọ xít xanh.

Cây ngô: Ngô hè thu giai đoạn phát triển bắp và thu hoạch; nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C và thích hợp nhất từ 25-28°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 22.4 - 26.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.5°C, tổng lượng mưa là 189.7mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh phấn đen, sâu cắn lá, sâu xanh đục trái, cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa có xu thế giảm với tổng lượng mưa khoảng 100mm, do đó cần chú ý kiểm tra đồng ruộng, đảm bảo cung cấp nước kịp thời cho cây trồng.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn cây con, phát triển thân lá và thu hoạch tùy thuộc vào diện tích gieo trồng khác nhau, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, tuần này nhiệt độ dao động từ 22.4 - 26.7°C, nên nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh khô đầu lá, bệnh xoắn trùn ngọn. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 28.1°C và lượng mưa giảm, có thể nhận định điều kiện thời tiết tuần sau tương đối thuận lợi cho sự phát triển của rau màu; tuy nhiên cần lưu ý một số loại sâu: sâu vẽ bùa, bọ phấn, sâu đục quả có thể phát triển nhẹ trong tuần tới.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 26.8 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là


88.4mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng trong khi lượng mưa giảm, các cây trồng cần được chú ý chăm sóc và lựa chọn biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng