



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 11 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 11 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 20.4 - 24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 37.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.0^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 9.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 12.6\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 35.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.8\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-07/12, Phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 08-12/12 phía Bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	24.9	19.1	22.0	27.9
Trong tuần	24.2	20.4	22.3	37.8
Tuần tới	24.0-27.0	13.0-16.0	18.5-21.5	0.0-5.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 11 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lạc vụ đông khu vực Bắc Trung Bộ: đang ở giai đoạn đâm tia. Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ $20.4 - 24.2^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C , tổng lượng mưa là 37.8mm. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính như: bệnh đốm lá muộng, sâu ăn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Dovatop 400SC liều lượng 5cc/10 lít nước, Dovatracol 72WP liều lượng 20g/10 lít nước, ... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ và lượng mưa dự báo tuần kế tiếp có xu hướng giảm, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp như: rầy mềm, sâu ăn lá.

Mía: tiếp tục giai đoạn tích lũy đường với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là $20-25^{\circ}\text{C}$. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần 3 tháng 11 dao động từ $20.4 - 24.2^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C , tổng lượng mưa là 37.8mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh căn mía gốc, bọ phấn trắng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Nurelle 25/2,5EC, Azorin 400WP, ... Dự báo tuần sau nhiệt độ và lượng mưa giảm so với tuần này, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng $18.5-21.5^{\circ}\text{C}$, cần lưu ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh bồ hóng, sâu đục thân mình tím.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn khai thác nhựa, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 20.4 - 24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 37.8mm và dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông như: sâu đục ngọn, bọ hung nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Ofatox 400EC, Nitox 30EC...

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn tích lũy bột, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C. Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 20.4 - 24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 37.8mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối củ sắn, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ bệnh có gốc đồng, nhóm thuốc có Carbendazim hoặc Kasumin. Theo dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần sau có xu hướng giảm với lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 0.0-5.0mm; cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối thân.

Ngô vụ đông: đang trong giai đoạn xoáy nõn, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C. Thống kê số liệu từ các trạm trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 20.4 - 24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 37.8mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu keo mùa thu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Kasumin Starner, Streptomycin,... Dự báo tuần sau lượng mưa và nhiệt độ có xu hướng giảm với nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh phấn đen, châu chấu.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là các loại cải, xà lách, hành tây, cà chua ... Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 20.4 - 24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 37.8mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chết cây con, sâu xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Validamycin, Pencycuron, Bacillus subtilis, ... Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ và lượng mưa có xu thế giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh bạch tạng, sâu xám.

Cây ăn quả có múi: đang trong giai đoạn chín, thu hoạch. Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 20.4 - 24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 37.8mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc có hoạt chất Benomyl, Mantalaxyl hoặc Propiconazole+Difenoconazole. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ và lượng mưa tuần

kế tiếp có xu hướng giảm với lượng mưa dự báo trong khoảng 0.0-5.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 13.0-16.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 18.5-21.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 0.0-5.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm, khi nhiệt độ thấp dưới 15 độ C thì cần chống rét cho cây trồng đặc biệt trên diện tích rau màu mới gieo trồng hoặc đang ở giai đoạn cây con như dùng rơm rạ ủ gốc cây; che phủ nilon, đảm bảo tưới đủ dinh dưỡng đồng thời có biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng