



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ
Tuần 3 tháng 11 năm 2021**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 11 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 20.3 - 23.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.1°C, tổng lượng mưa là 255.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng .9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 170mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 85.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 220.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-07/12, Phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 08-12/12 phía Bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.4	22.9	24.1	425.4
Trong tuần	23.9	20.3	22.1	255.4
Tuần tới	27-30	16-19	21.5-24.5	20-50

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 3 tháng 11 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây ngô: đang trong giai đoạn phát triển thân lá - trổ cờ - phun râu. Trong các giai đoạn phát triển thân lá - trổ cờ - thâm râu, cây ngô đòi hỏi đất phải đủ ẩm với độ ẩm của đất từ 75-80%, nắng nhẹ, trời lặng gió, mưa ít và nhiệt độ từ 22-25°C. Trong điều kiện thời tiết có mưa to sẽ khiến cho các hạt phấn bị trôi hết, gây ảnh hưởng tới quá trình thụ phấn ở cây ngô. Tuần 3 tháng 11, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 20.3-23.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.1°C, lượng mưa của khu vực đạt 255.4mm. Có thể nhận thấy điều kiện nhiệt độ trong tuần cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây ngô, tuy nhiên lượng mưa trong tuần khá lớn gây ảnh hưởng tới các diện tích ngô đang trong giai đoạn trổ cờ - tung phấn. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu keo mùa thu, sâu đục thân, rệp hại cờ... Tuần tiếp theo, dự báo lượng mưa của khu vực có xu thế giảm mạnh với lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 20-50mm. Người dân cần tranh thủ thời tiết để chăm sóc phục hồi cho các diện tích ngô bị ảnh hưởng cho mưa lớn gây ra từ nhiều tuần trước.

Cây lạc vụ mùa: tiếp tục trong giai đoạn phát triển thân lá – ra hoa. Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, tuần này khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm đáng kể so với tuần trước, với mức giảm của nhiệt độ không khí trung bình 2.0°C (nhiệt độ không khí trung bình tuần trước đạt 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình tuần này đạt 22.1°C), lượng mưa trong tuần này

của khu vực giảm mạnh so với tuần trước (tuần này lượng mưa của khu vực đạt 255.4mm, giảm 170.0mm so với tuần trước). Cây lạc sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 24-33°C, trong thời kỳ phát triển thân lá cây lạc đòi hỏi đảm bảo cung cấp đầy đủ nước tuy nhiên cũng không được úng. Đối chiếu với điều kiện thời tiết trong tuần, có thể thấy tuần này thời tiết của khu vực Trung Trung Bộ không thuận lợi cho cây lạc sinh trưởng. Sâu xám, sâu khoang, bệnh lở cổ rễ, bệnh gỉ sắt... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây lạc trong tuần. Dự báo, tuần tới, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 16-30°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 20-50mm. Cần chú ý, bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần tranh thủ tình hình thời tiết để chăm sóc giúp cho cây lạc nhanh chóng phục hồi.

Cây sắn: vụ đông xuân 2020-2021 tiếp tục trong giai đoạn nuôi củ - thu hoạch, vụ hè thu 2021 đang trong giai đoạn phát triển thân lá - tạo củ. Nhiệt độ thích hợp cho cây sắn sinh trưởng và phát triển từ 23-27°C. Trong tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 22.1°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 255.4mm. Điều kiện nhiệt độ thấp, lượng mưa nhiều gây ảnh hưởng không tốt tới sinh trưởng của cây sắn. Các đối tượng: bệnh khảm lá sắn do virus, bộ phận trắng, rệp sáp bột hồng tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây sắn trong tuần. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần tiếp tục thu gom và tiêu hủy những cây đã bị nhiễm bệnh để tránh cho bệnh lây lan trên diện rộng. Tuần tiếp theo, dự báo nền nhiệt độ trung bình của khu vực dao động trong khoảng 21.5-24.5°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 20-50mm. Trong quá trình chăm sóc cần lưu ý diễn biến của đối tượng: bệnh khảm lá do virus tiếp tục phát sinh gây hại trên cây sắn.

Cây ăn quả có múi (cam, chanh): tiếp tục trong giai đoạn quả chín - thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển từ 23-29°C. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, tuần này nhiệt độ thấp nhất của khu vực đạt 20.3°C, nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 22.1°C, nhiệt độ cao nhất của khu vực đạt 23.9°C, lượng mưa của khu vực đạt 255.4mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần không thuận lợi cho sinh trưởng của cây ăn quả có múi, làm tăng khả năng rụng quả ở cây trong điều kiện thời tiết mưa nhiều. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục quả, sâu đục thân/cành, bệnh chảy gôm, bệnh loét sẹo,... Dự báo, tuần tới khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ thấp, lượng mưa dự báo của khu vực dao động từ 20-50mm. Lưu ý các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi để kịp thời có các biện pháp phòng trừ.

Cây cao su: tiếp tục trong giai đoạn khai thác mủ. Nhiệt độ thích hợp cho cây cao su phát triển từ 25-30°C. Tuần 3 tháng 11, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to gây ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của cây cao su; ngoài ra trong tuần 3 tháng 11 khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm thấp nằm ngoài phạm vi sinh trưởng tốt của cây cao su cũng là điều kiện không thuận lợi cho cây cao su sinh trưởng và phát triển. Trong tuần, cây cao su chịu ảnh hưởng của một số đối tượng sâu bệnh hại: bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh rụng lá mùa mưa, bệnh phấn trắng... Tuần 1 tháng 12, dự báo nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 16-30°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động từ 20-50mm, cần tiếp tục lưu ý các đối tượng: bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh phấn trắng... phát sinh gây hại trên cây cao su.

Cây hồ tiêu: tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch. Yêu cầu về điều kiện nhiệt độ thích hợp cho cây hồ tiêu sinh trưởng từ 25-27°C. Tuần này, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 20.3-23.9°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 255.4mm. Trong tuần này, khu vực Trung Trung tiếp tục có lượng mưa tương đối nhiều, gây ảnh hưởng đến công tác thu hoạch các diện tích tiêu đã chín. Sâu bệnh hại trên cây tiêu trong tuần: bệnh chết nhanh, bệnh thán thư, bệnh tiêu đen... Dự báo, tuần tới, lượng mưa dự báo của khu vực có xu thế giảm đáng kể. Người dân cần tranh thủ thời tiết để tiếp tục thu hoạch các diện tích tiêu đã chín.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 16-30°C, nhiệt độ không khí trung bình của khu vực dao động trong khoảng 21.5-24.5°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 20-50mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý bảo đảm nhu cầu về nước, dinh dưỡng và có các biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng