



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 2 tháng 12 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 12 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 13.6 - 21.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.4°C, tổng lượng mưa là 1.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng .4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng .2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng .3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm .6$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 20-24/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 25-30/12, có mưa vài nơi, riêng ngày 25-26/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Sơn La, Hòa Bình trời rét, có nơi rét đậm. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	21.5	11.2	16.3	2.1
Trong tuần	21.3	13.6	17.4	1.8
Tuần tới	23-26	8 -11	15.5-18.5	5-15

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 2 tháng 12 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây ngô: cây ngô trong khu vực Tây Bắc đang trong các giai đoạn trổ cờ - phun râu – phát triển bắp. Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh của cây ngô lúc này là nhiệt độ từ 22-25°C, độ ẩm từ 75-80% độ ẩm tối đa của đồng ruộng, độ ẩm không khí khoảng 80%, trời lặng gió nhẹ, ít mưa, nắng nhẹ. Tuần 2 tháng 12, khu vực Tây Bắc tiếp tục có nền nhiệt độ và lượng mưa thấp khiến cho cây ngô sinh trưởng và phát triển kém. Do đó, người dân cần chú ý bổ sung thêm nước và phân bón để cây ngô tăng khả năng sinh trưởng trong điều kiện thời tiết không tốt. Sâu bệnh hại trên cây ngô chủ yếu: sâu keo mùa thu, sâu đục thân, bệnh huyết dụ, bệnh vàng lá, đốm lá... Tuần 3 tháng 12, dự báo khu vực Tây Bắc tiếp tục có lượng mưa thấp, người dân cần chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây ngô.

Cây lạc: tiếp tục trong giai đoạn phát triển củ. Tuần này, nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 17.4°C, lượng mưa của khu vực đạt 1.8mm. Thời tiết lạnh và mưa ít khiến cho cây lạc bị thiếu nước và sinh trưởng kém (thậm chí ngừng phát triển). Người dân cần tưới thêm nước bổ sung cho cây lạc đồng thời bón phân (giảm lượng phân đạm, bón tăng cường lượng phân lân và kali để cây lạc tăng cường khả năng chống chịu trước thời tiết lạnh). Trong tuần, cây lạc chịu tác động bởi một số đối tượng sâu bệnh hại: bệnh thối gốc lở cổ rễ, sâu khoang, sâu xanh... Tuần tiếp theo, dự báo nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 8.0-26.0°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao

động trong khoảng 5.0-15.0mm. Trong thời gian tới, người dân cần tiếp tục bảo đảm nhu cầu về nước cho cây lạc.

Cây khoai tây: đang trong giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ. Trong tuần, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây khoai tây, tuy nhiên lượng mưa trong tuần quá thấp. Là một loại cây ưa ẩm, do đó nhu cầu về nước của cây khoai tây rất cao. Với điều kiện thời tiết trong tuần như trên, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung để bảo đảm nhu cầu về nước cho cây khoai tây. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây khoai tây trong tuần: bệnh đốm vòng, bệnh mốc sương, bệnh ghẻ củ... Dự báo, tuần tiếp theo, lượng mưa của khu vực Tây Bắc dao động từ 5.0-15.0mm, người dân cần tiếp tục chú ý tưới thêm nước cho cây khoai tây.

Cây sắn: tiếp tục trong giai đoạn tích lũy tinh bột - thu hoạch. Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, tuần này, khu vực Tây Bắc tiếp tục có lượng mưa thấp (1.8mm), đây là điều kiện rất thuận lợi cho việc thu hoạch và chế biến các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm. Bệnh khảm lá sắn do virus, bệnh sùng trắng... tiếp tục là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây sắn trong tuần. Tuần tới, dự báo khu vực Tây Bắc tiếp tục có thời tiết tạnh ráo, người dân cần tranh thủ thời tiết để thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm, sau thu hoạch cần nhanh chóng thu gom những cây bị bệnh để tiêu hủy nhằm bảo đảm cho nguồn hom sắn sạch cho vụ sau.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): tiếp tục trong giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Tuần 2 tháng 12, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 13.4-21.3°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 1.8mm. Có thể nhận thấy, thời tiết trong tuần thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích quả chín. Tuy nhiên, với lượng mưa trong tuần quá thấp, người dân cần chủ động tưới thêm nước để bảo đảm sinh trưởng của cây. Trong tuần, cây ăn quả có múi chịu tác động bởi các đối tượng: bệnh vàng lá thối rễ, sâu đục thân/cành... Dự báo, tuần 3 tháng 12 nền nhiệt độ trung bình của khu vực dao động trong khoảng 15.5-18.5°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 5.0-15.0mm. Đối với các diện tích cây ăn quả đã chín, cần tiếp tục thu hoạch; đối với các diện tích cây ăn quả đang trong giai đoạn phát triển quả, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây.

Cây vải: tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc. Thời tiết trong tuần này của khu vực Tây Bắc với nền nhiệt độ trung bình đạt 17.4°C, lượng mưa đạt 1.8mm tiếp tục là điều kiện thuận lợi cho việc kìm hãm lộc vải phát triển, tạo điều kiện cho hoa vải ra đúng thời điểm và bảo đảm năng suất cho vụ vải năm sau. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây vải trong tuần: sâu đục thân, bệnh đốm nâu, bệnh thán thư... Tuần tiếp theo, dự báo khu vực Tây Bắc tiếp tục có nền nhiệt độ và lượng mưa thấp, người dân cần tiếp tục chú ý các biện pháp chăm sóc cho cây vải (ngắt lộc đông ra sớm, khoanh cành...).

Cây chè: tiếp tục trong giai đoạn phát triển búp – thu hái. Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực Tây Bắc tăng nhẹ so với tuần trước (với mức tăng của nhiệt độ không khí trung bình 1.1°C), lượng mưa trong tuần của khu vực vẫn ở mức rất thấp 1.8mm. Trong điều kiện thời tiết lạnh và mưa ít, cây chè sinh trưởng kém gây ảnh

hưởng đến năng suất và chất lượng của búp chè thu hoạch được. Do đó, trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý tưới nước bổ sung cho cây chè. Bọ cánh tơ, rầy xanh, bọ xít muỗi... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây chè. Dự báo tuần tới, nhiệt độ thấp nhất của khu vực dao động trong khoảng 8.0-11.0°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 5.0-15.0mm. Với lượng mưa dự báo tuần tới tương đối thấp, người dân cần chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây chè.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 8.0-26.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.5-18.5°C, tổng lượng mưa là 5.0-15.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa thấp. Các cây trồng cần được chú ý bảo đảm nhu cầu về nước, dinh dưỡng, chủ động các biện pháp giữ ẩm cho cây trồng, đồng thời có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng