



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 3 tháng 12 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 12 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 13.1 – 19.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.2°C, tổng lượng mưa là 18.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 16,9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 6,2$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 8,7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1,7$ mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-08/01, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm; từ ngày 03/01 đêm và sáng trời rét. Từ đêm 08-11/01, có mưa vài nơi, riêng đêm 08 ngày 09/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	21.3	13.6	17.4	1.8
Trong tuần	19.3	13.1	16.2	18.7
Tuần tới	26-29	13-16	19.5-22.5	5-15

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 3 tháng 12 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây ngô: cây ngô trong khu vực Tây Bắc đang trong các giai đoạn trổ cờ - phun râu – phát triển bắp. Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh của cây ngô lúc này là nhiệt độ từ 22-25°C, độ ẩm từ 75-80% độ ẩm tối đa của đồng ruộng, độ ẩm không khí khoảng 80%, trời lặng gió nhẹ, ít mưa, nắng nhẹ. Tuần 2 tháng 12, khu vực Tây Bắc tiếp tục có nền nhiệt độ và lượng mưa thấp khiến cho cây ngô sinh trưởng và phát triển kém. Do đó, người dân cần chú ý bổ sung thêm nước và phân bón để cây ngô tăng khả năng sinh trưởng trong điều kiện thời tiết không tốt. Sâu bệnh hại trên cây ngô chủ yếu: sâu keo mùa thu, sâu đục thân, bệnh huyết dụ, bệnh vàng lá, đốm lá... Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng, tuy nhiên lượng mưa của khu vực vẫn ở mức rất thấp. Do đó, người dân cần chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây ngô.

Cây lạc: tiếp tục trong giai đoạn phát triển củ. Tuần này, nền nhiệt độ trung bình của khu vực có xu thế giảm (với mức giảm 1.2°C so với tuần trước, tuần trước nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 17.4°C), lượng mưa tuần này của khu vực có xu thế tăng tuy nhiên vẫn ở mức rất thấp (18.7mm). Trong điều kiện thời tiết nói trên, cây lạc sinh trưởng chậm. Người dân cần tưới thêm nước bổ sung cho cây lạc đồng thời bón phân (giảm lượng phân đạm, bón tăng cường lượng phân lân và kali để cây lạc tăng cường khả năng chống chịu trước thời tiết lạnh). Trong tuần, do thời tiết lạnh nên sâu bệnh gây hại cũng phát triển kém. Dự báo, tuần tiếp theo nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 13-29°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 5-15mm. Cần chú ý tưới thêm nước cho cây lạc.

Cây khoai tây: đang trong giai đoạn phát triển thân lá – phát triển củ. Trong tuần, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây khoai tây, tuy nhiên lượng mưa trong tuần quá thấp. Là một loại cây ưa ẩm, do đó nhu cầu về nước của cây khoai tây rất cao. Với điều kiện thời tiết trong tuần như trên, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung để bảo đảm nhu cầu về nước cho cây khoai tây. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây khoai tây trong tuần: bệnh đốm vòng, bệnh mốc sương, bệnh ghẻ củ... Tuần tới dự báo lượng mưa của khu vực tiếp tục ở mức thấp, do đó người dân vẫn cần tưới thêm nước để bảo đảm nhu cầu về nước của cây khoai tây.

Cây sắn: tiếp tục trong giai đoạn tích lũy tinh bột - thu hoạch. Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, tuần này, khu vực Tây Bắc tiếp tục có lượng mưa thấp (18.7mm), đây là điều kiện rất thuận lợi cho việc thu hoạch và chế biến các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm. Bệnh khảm lá sắn do virus, bệnh sùng trắng... tiếp tục là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây sắn trong tuần. Người dân cần tiếp tục thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm, sau thu hoạch cần thu gom và tiêu hủy những cây đã bị nhiễm bệnh để tránh bệnh lây lan. Tuần tới, dự báo thời tiết của khu vực tiếp tục thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích sắn củ đã cho thu hoạch.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): tiếp tục trong giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Tuần 3 tháng 12, khu vực Tây Bắc có lượng mưa đạt 18.7mm, nhiệt độ trung bình tuần của khu vực đạt 16.2°C. Trong điều kiện nhiệt độ và lượng mưa thấp, cây ăn quả có múi sinh trưởng kém. Người dân cần chú ý tưới nước và bón phân cho cây để bảo đảm cây sinh trưởng khỏe mạnh và bảo đảm chất lượng quả khi thu hoạch. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục thân/cành, bệnh vàng lá thối rễ... Tuần 1 tháng 1 năm 2022, dự báo nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 13-29°C, lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 5-15mm, chú ý chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây ăn quả có múi.

Cây vải: tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc. Trong tuần, thời tiết của khu vực tiếp tục với nền nhiệt độ và lượng mưa thấp là điều kiện thuận lợi cho việc kìm hãm lộc vải phát triển, tạo điều kiện cho hoa vải ra đúng thời điểm và bảo đảm năng suất cho vụ vải năm sau. Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây vải trong tuần: sâu đục thân, bệnh đốm nâu, bệnh thán thư... Tuần tới, nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng, lượng mưa dự báo của khu vực tiếp tục ở mức thấp (5-15mm). Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý theo dõi các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây vải để kịp thời phòng trừ hiệu quả.

Cây chè: chuyển sang giai đoạn đốn – chăm sóc. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, tuần này, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 13.1-19.3°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 18.7mm. Cây chè chuyển sang giai đoạn đốn – chăm sóc, người dân cần chú ý cắt tỉa cành lá (các cành già, cành sâu bệnh, cành tăm) để tạo điều kiện cho những cành khỏe mạnh phát triển cũng như hạn chế sâu bệnh. Trong tuần và nhiều tuần nay khu vực Tây Bắc có lượng mưa rất thấp, do đó người dân cần chủ động nguồn nước để tưới bổ sung cho cây chè. Sâu đục thân, bọ xít muỗi... là một số đối tượng gây hại chủ yếu trên cây chè trong tuần. Tuần tới, dự báo

khu vực Tây Bắc tiếp tục có lượng mưa thấp, người dân cần chú ý các biện pháp chăm sóc và tưới nước giúp cây chè nhanh chóng phục hồi sau thu hoạch.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 13-29°C. nhiệt độ không khí trung bình 19.5-22.5°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực dao động từ 5-15mm. Do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm. Các cây trồng cần được chú ý bảo đảm nhu cầu về nước, dinh dưỡng và có các biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng