



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
Tuần 1 tháng 4 năm 2021**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 4 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 23.1 - 31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0°C, tổng lượng mưa là 26.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 11.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 8.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 13.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 11-16/4, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Bắc chiều tối ngày 16/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 17-18/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển lạnh. Từ ngày 19-21/4, có mưa rào và dông vài nơi. (Nguồn: Trung tâm dự báo KTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.8	19.7	24.3	15.3
Trong tuần	31.0	23.1	27.0	26.8
Tuần tới	28.0-31.0	22.0-25.0	25.0-28.0	30.0-50.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 4 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: đang trong giai đoạn làm đòng - trổ. Nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là 25-32°C. Thống kê số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 23.1 - 31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0°C, tổng lượng mưa là 26.8mm, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết tuần này tương đối thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần cần chú ý một số loại sâu bệnh chính: bệnh vàng lùn, sâu đục thân 5 vạch đen. Khi phát hiện diện tích lúa bị nhiễm bệnh, có thể sử dụng một số biện pháp như: ngắt danh héo, ổ trứng; bẫy đèn đồng loạt bắt bướm hoặc phun các loại thuốc như: Padan 95SP, Gegent 800WP... Với số liệu dự báo, nhiệt độ thay đổi không đáng kể và lượng mưa dự báo tăng so với tuần này, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp như: bệnh vân nâu hại lúa, rầy lưng trắng.

Mía: diện tích mía trong khu vực ở giai đoạn đẻ nhánh với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 26-30°C, nhiệt độ tuần 1 tháng 4 dao động trong dao động từ 23.1 - 31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0°C, tổng lượng mưa là 26.8mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này tương đối thích hợp cho mía phát triển, cần

lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh cháy lá, bọ phấn trắng; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời như: sử dụng thuốc hóa học 50% carbendazim WP, 75% chlorothalonil WP, 70% thiophanate - methyl WP, 65% zineb WP hòa loãng 800-1000 lần để xử lý hom hoặc phun. Dự báo tuần sau nhiệt độ thay đổi không đáng kể, lượng mưa có xu hướng tăng, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh cháy lá, bọ phấn trắng.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.1 - 31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0°C, tổng lượng mưa là 26.8mm và dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp thay đổi không đáng kể so với tuần này, lượng mưa có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh tuyến trùng, sâu róm thông, bệnh gỉ sắt, sâu đục nõn thông.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 20-32°C, theo thống kê số liệu khí tượng tuần qua, khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt tuần dao động từ 23.1 - 31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0°C, tổng lượng mưa là 26.8mm, phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tuần sau thay đổi không đáng kể, lượng mưa có xu thế tăng; cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút.

Ngô: trong giai đoạn cây con - trở cò, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 20-30°C. Nhiệt độ tuần này dao động từ 23.1 - 31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0°C, tổng lượng mưa là 26.8mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ xít; khi xuất hiện sâu bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như: Thu gom các bộ phận bị bệnh đi tiêu hủy, bón phân chuồng hoai mục và chế phẩm Trichoderma. Dự báo tuần sau lượng mưa tăng và nhiệt độ thay đổi không đáng kể so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh gỉ sắt ngô, mọt hại.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là đậu cô ve, dưa chuột, bí, rau thơm...Nhiệt độ trung bình tuần này là 27.0 độ C, tăng so với tuần trước, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa. Theo số liệu dự báo, lượng mưa có xu thế tăng trong khi nhiệt độ tuần kế tiếp thay đổi không đáng kể, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: sâu xanh, sâu cuốn lá.

Cây ăn quả có múi: đang ở giai đoạn ra quả non. Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tuần dao động từ 23.1 - 31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0°C, tổng lượng mưa là 26.8mm, chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh thối rễ, bọ

trĩ, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như: phun thuốc lên cây để diệt bọ trĩ như Abamectin, Sagolex, Bassan, Trebon, Confidor, Cypermethrin khi cây bắt đầu ra nụ nếu bọ có mật độ cao và sau khi hoa rụng 15 ngày. Số liệu dự báo cho thấy lượng mưa có xu thế tăng và nhiệt độ tuần tiếp theo không thay đổi đáng kể so với tuần này; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thán thư, nhện.


Thông kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 28.0-31.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 22.0-25.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 25.0-28.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 30.0-50.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ không thay đổi đáng kể và lượng mưa có xu thế tăng, cần chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật và phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng