



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 2 tháng 4 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 4 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 18.8 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 63.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 7.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 18.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 19.2\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 18.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 5\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-ngày 25/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng ngày 23-25/4 có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 25-26/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Từ ngày 27/4-01/5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 30/4 và 01/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.8	18.2	22.0	44.8
Trong tuần	24.1	18.8	21.5	63.6
Tuần tới	30.0-33.0	22.0-25.0	26.0-29.0	30.0-60.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 4 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa mùa sớm trong khu vực: đang ở giai đoạn đứng cái, điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là 28-30°C. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 18.8 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 63.6mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh thối gốc, sâu cuốn lá lớn, người dân cần thăm ruộng thường xuyên, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng các biện pháp như dùng các loại thuốc Padan 95SP, Regent 800WP, Sumithion 50EC, Karate 2.5EC... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn ra quả non. Nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây vải là 24

- 29°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 18.8 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 63.6mm, nền nhiệt tương đối thấp cho giai đoạn phát triển này của cây vải. Trong giai đoạn phát triển này cần chú ý bệnh sương mai, bọ xít, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Ridomi gold 68WP nồng độ 0,2%; Aliette 800 WP nồng độ 0,2 % để phun; Mikal 800WG; Alpine 80WP. Số liệu dự báo tuần tới cho thấy nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng, trong khi lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh cháy lá, côn trùng cánh cứng.

Cây ăn quả có múi: đang trong giai đoạn ra quả non. Nhiệt độ thích hợp cho cây ăn quả có múi phát triển giai đoạn này là từ 23-29°C. Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 18.8 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 63.6mm, có thể nhận thấy nền nhiệt tương đối thấp cho giai đoạn phát triển này của cây. Cần chú ý một số sâu bệnh có hại như: bệnh tàn lụi, sâu đục trái; khi phát hiện sâu bệnh cần sử dụng một số biện pháp như: bọc quả khi quả to bằng quả chanh sử dụng vải màn lưới, sử dụng thuốc gốc Phenthoate (Dimephenthoate) hoặc Fenvalerate để phun trừ sâu. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng (dao động trong khoảng 26.0 - 29.0°C), lượng mưa dự báo có xu thế giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh sẹo, rệp sáp.

Cây ngô: đang ở giai đoạn phun râu và phát triển bắp, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 18.8 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 63.6mm, có thể thấy nhiệt độ tuần này tương đối thấp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần chú ý một số sâu bệnh có khả năng phát triển như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng (nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 26.0-29.0°C và lượng mưa có xu thế giảm (lượng mưa dự báo trong khoảng 30.0-60.0mm), cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh gỉ sắt ngô, mọt hại.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, mỗi loại rau có khoảng nhiệt độ phát triển phù hợp riêng. Thống kê số liệu khí tượng cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 18.8 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 63.6mm, nền nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển cho nhóm rau màu chịu nhiệt trung bình. Cần chú ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh bạch tạng, sâu xám. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí có xu thế tăng trong khi lượng mưa dự báo giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau.

Cây lạc: đang giai đoạn phân cành - đâm tia. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 18.8 - 24.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.5°C, tổng lượng mưa là 63.6mm, cần chú ý bệnh đốm lá muện, rầy mềm, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Actara (pha 25-30

g/ha, 1g/bình 8 lít nước), Polytrin P 440EC (pha 20ml/ bình 8 lít nước). Số liệu dự báo tuần tới cho thấy nhiệt độ không khí tăng trong khi lượng mưa dự báo giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển như: bệnh héo khô trên thân, sâu ăn tạp.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 22.0-25.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 30.0-60.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm, cần chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật và phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng