



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
Tuần 2 tháng 4 năm 2021**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 4 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 22.0 - 26.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 82.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 62.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 18.7 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 59.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 2.5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-25/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 25-26/4, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát. Từ ngày 27/4-01/5, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 30/4 và 01/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.4	22.1	24.2	20.0
Trong tuần	26.4	22.0	24.2	82.2
Tuần tới	30.0-33.0	22.0-25.0	26.0-29.0	15.0-30.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 4 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: theo thống kê tuần 2 tháng 4 diện tích lúa đang giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 25-32°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy: nền nhiệt độ tuần này dao động từ 22.0 - 26.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 82.2mm, có thể nhận thấy nền nhiệt trong tuần tương đối thấp cho giai đoạn phát triển này của lúa trong khu vực. Tuy nhiên, cần chú ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh virus lúa, sâu đục thân, người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Regent 800WG, Virtako 40WG, Sacophos 550EC... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh thối thân, nhện gié.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả non. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí trong tuần dao động từ 22.0 - 26.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 82.2mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần lưu ý các loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ nám, bệnh loét, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng các loại thuốc gốc đồng như Boocđô 1%, Kasuran

0,15%, champion 37,5FL, Boocđô + zineb, Copper oxychloride... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng trong khoảng 26.0 - 29.0°C, lượng mưa dự báo giảm mạnh từ 15.0 - 30.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh thối rễ, bọ trĩ.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô đang trong giai đoạn phun râu, phát triển bắp. Nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn phát triển này của ngô là 20 - 30°C. Theo số liệu thống kê từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này có nhiệt độ không khí dao động từ 22.0 - 26.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 82.2mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; chú ý một số bệnh phổ biến: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế tăng và tổng lượng mưa dự báo có xu hướng giảm so với tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân.

Cây nhãn: đang trong giai đoạn quả non với diện tích nhãn được trồng nhiều nhất ở Hưng Yên và Hải Dương. Nhiệt độ thích hợp cho nhãn phát triển giai đoạn này là 25 - 32°C. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 2 tháng 4 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 22.0 - 26.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 82.2mm, có thể thấy nền nhiệt tương đối thấp cho giai đoạn phát triển của nhãn. Cần chú ý bệnh thối rỉ, sâu đục gân lá trong giai đoạn này. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng và lượng mưa dự báo giảm, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh bồ hóng, dơi.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó, ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, nhiệt độ trong tuần dao động từ 22.0 - 26.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 82.2mm, chú ý một số bệnh: bệnh đốm trắng, bọ xít. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng trong khi lượng mưa dự báo giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè mất lưới, nhện đỏ.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, thống kê số liệu khí tượng cho thấy tuần 2 tháng 4 có nền nhiệt độ dao động từ 22.0 - 26.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 82.2mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu xám. Khi phát hiện diện tích rau màu nhiễm bệnh, có thể sử dụng một số loại thuốc như: Basudin 50EC, Shecpain 36EC, Gottoc 250EC... Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng tăng (nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C) trong khi lượng mưa có xu hướng giảm (15.0-30.0mm), cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh thối gốc, sâu tơ.

Cây lạc trong khu vực: đang ở giai đoạn phân cành - đâm tia. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Nước là yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, đặc biệt ở thời kỳ sinh trưởng của lạc. Thống kê số liệu khí tượng cho thấy, tuần này có nền nhiệt độ dao động từ 22.0 - 26.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 82.2mm, cần chú ý bệnh đốm lá

muộn, sâu ăn lá. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng trong khi lượng mưa có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 22.0-25.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 15.0-30.0mm, tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng và lượng mưa có xu thế giảm, cần chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật và phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng