



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP  
KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ  
Tuần 1 tháng 4 năm 2021**

**I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp**


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 4 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 22.2 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.3°C, tổng lượng mưa là 29.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.8^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 23.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 9.9$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 7.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.5$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 12-22/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối ngày 18/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	27.9	20.2	24.1	53
Trong tuần	32.5	22.2	27.3	29.7
Tuần tới	29-32	23-26	26-29	15-30

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 1 tháng 4 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa Đông xuân: khu vực Trung Trung Bộ trà sớm đang trong giai đoạn chín – thu hoạch, trà chính vụ giai đoạn chắc xanh – thu hoạch, trà muộn đang trong giai đoạn làm đòng – ngâm sữa. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh so với tuần trước, dao động trong khoảng từ 22.2-32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.3°C, lượng mưa của khu vực có giảm 29.7mm. Điều kiện thời tiết tuần này khá thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích lúa đã chín. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu: rầy các loại, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép hạt...tiếp tục phát sinh gây hại trên cây lúa. Lưu ý: đối với các diện tích lúa trong giai đoạn chín – thu hoạch cần tiến hành rút cạn nước trong ruộng lúa trước khi thu hoạch 10-15 ngày, đối với các diện tích lúa đang trong giai đoạn làm đòng - chắc xanh nên duy trì mực nước trên ruộng khoảng 5cm để lúa phát triển một cách tốt nhất. Dự báo, tuần tới, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 23-32°C, nhiệt độ không khí trung bình dao động 26-29°C, lượng mưa dự báo của khu vực tiếp tục ở mức thấp. Cần tiếp tục chú ý các đối tượng sâu bệnh hại: bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt...

Cây ngô Đông xuân: đang trong giai đoạn trỗ cờ - thâm râu – thu hoạch. Trong giai đoạn trỗ cờ - thâm râu – thu hoạch nhiệt độ thích hợp cho cây ngô từ 22-25°C và độ ẩm đất thích hợp từ 75-80% độ ẩm tối đa đồng ruộng. Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, tuần này, nền nhiệt độ của khu vực

Việt Bắc tăng đáng kể so với tuần trước (trung bình tăng  $3.2^{\circ}\text{C}$ ), dao động trong khoảng  $22.2-32.5^{\circ}\text{C}$ , lượng mưa của khu vực giảm  $23.3\text{mm}$  so với tuần trước (lượng mưa trong tuần đạt  $29.7\text{mm}$ ). Điều kiện nhiệt độ khá thuận lợi thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên lượng mưa của khu vực tương đối nhỏ, cần lưu ý tưới nước bổ sung cho cây ngô đồng thời theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại: sâu keo mùa thu, sâu đục thân, sâu cắn lá....Dự báo, tuần tiếp theo, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng  $23-32^{\circ}\text{C}$ , lượng mưa của khu vực dao động  $15-30\text{mm}$ , cần tiếp tục chú ý các đối tượng sâu bệnh có khả năng phát sinh gây hại.

Cây lạc Đông Xuân: đang giai đoạn quả non – thu hoạch. Cây lạc sinh trưởng và phát triển thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ từ  $24-33^{\circ}\text{C}$ . Lạc là loại cây có khả năng chịu hạn ở một mức độ nhất định, nước là yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cây lạc. Tuần 1 tháng 4 khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng  $22.2-32.5^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình  $27.3^{\circ}\text{C}$ , lượng mưa của khu vực  $29.7\text{mm}$ . Điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho cây lạc sinh trưởng và phát triển. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu trên cây lạc: mối, bệnh thối hạt, bệnh đậu đục...Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng, lượng mưa của khu vực có xu thế giảm, cần chú ý tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch các diên tích lạc đã đạt thành phẩm.

Cây mía: đang trong giai đoạn cây con – vươn lóng. Mía là loại cây sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ  $26 - 33^{\circ}\text{C}$  và độ ẩm  $75-85\%$ . Tuần 1 tháng 4, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa giảm so với tuần trước, cụ thể: nhiệt độ không khí trung bình tăng  $3.2^{\circ}\text{C}$  so với tuần trước (nhiệt độ không khí trung bình tuần này  $27.3^{\circ}\text{C}$ ), lượng mưa của khu vực giảm  $23.3\text{mm}$  so với tuần trước (lượng mưa tuần này đạt  $29.7\text{mm}$ ). Điều kiện thời tiết khá thích hợp cho cây mía phát triển. Bệnh chồi cỏ, rệp sáp, bệnh trắng lá mía...tiếp tục là các đối tượng sâu bệnh gây hại chủ yếu trên cây mía. Dự báo, tuần 2 tháng 4, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng  $23-32^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình của khu vực dao động  $26-29^{\circ}\text{C}$ , lượng mưa của khu vực dao động  $15-30\text{mm}$ . Cần tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây tiêu: đang trong giai đoạn chăm sóc. Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ  $10 - 35^{\circ}\text{C}$ , nhưng thích hợp nhất từ  $25 - 27^{\circ}\text{C}$ . Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực dao động  $22.2-32.5^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình  $27.3^{\circ}\text{C}$ , lượng mưa của khu vực  $29.7\text{m}$ . Điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây tiêu phát triển. Trong tuần, các sâu bệnh hại chủ yếu trên cây tiêu: tuyến trùng hại, rệp các loại, bệnh chết nhanh/chết chậm...Tuần tiếp theo, dự báo nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng  $23-32^{\circ}\text{C}$ , lượng mưa của khu vực dao động  $15-30\text{mm}$ . Cần tiếp tục chú ý các đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu: rệp các loại, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư...

Cây điều: trong giai đoạn quả non-thu hoạch. Điều là loại cây ưa sáng, thích hợp sống trong điều kiện nhiệt độ trung bình khoảng  $27^{\circ}\text{C}$  và độ ẩm không khí từ  $68-77\%$ . Tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng đáng kể so với tuần

trước (khoảng 3.2°C) dao động trong khoảng từ 22.2-32.5°C, lượng mưa của khu vực giảm (khoảng 23.3mm so với tuần trước, lượng mưa tuần này đạt 29.7mm). Điều kiện thời tương đối thuận lợi cho cây điều phát triển. Trong tuần, cây điều chịu tác động của một số sâu bệnh hại: bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành... Dự báo, tuần 2 tháng 4, nền nhiệt độ của khu vực Trung Trung Bộ dao động trong khoảng 23-32°C, nhiệt độ không khí trung bình của khu vực dao động 26-29°C, lượng mưa của khu vực dao động 15-30mm. Chú ý: theo dõi chặt chẽ diễn biến các loại sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 23-32°C, nhiệt độ không khí trung bình của khu vực dao động 26-29°C, lượng mưa của khu vực dao động 15-30mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, thời tiết của khu vực Trung Trung Bộ cơ bản không có sự thay đổi nhiều so với tuần này, các cây trồng cần tiếp tục được chú ý bảo đảm đủ nước, dinh dưỡng và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Nguyễn Thị Chang**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**