



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 5 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 5 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 23.9 - 32.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 59.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.7^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.8^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 69.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 19.8 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 39.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-17/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng phía Bắc chiều tối và tối ngày 17/5 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 18-21/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc chiều tối và tối thời kỳ từ ngày 18-19/5 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm DBKTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31.1	23.2	27.1	129.6
Trong tuần	32.4	23.9	28.1	59.7
Tuần tới	35.0-40.0	26.0-29.0	30.5-34.5	10.0-30.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 5 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: đang trong giai đoạn chín sấp - thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là từ 20-30°C. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 23.9 - 32.4°C, nhiệt độ trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 59.7mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần giảm so với tuần trước, điều kiện thời tiết tuần này tương đối thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen; khi phát hiện diện tích nhiễm sâu bệnh có thể bón phân đúng kỹ thuật, đúng giai đoạn, bón đạm nặng đầu nhẹ cuối, bón thúc sớm cân đối với kali theo tỷ lệ nhất định. Ruộng lúa cần điều chỉnh mức nước thích hợp, nên để mức nước nông (5 - 10cm), nhất là sau khi lúa đẻ nhánh, nếu thấy bệnh chóm xuất hiện thì có thể rút nước, tháo nước để khô ruộng trong 2 - 3 ngày để hạn chế sự sinh trưởng của cây, rắc vôi 60 - 80 kg/ha lúc lúa mới chớm bị bệnh, hoặc dùng 1 số loại thuốc như Kasuran 0,1 - 0,2%. Với số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp tăng trong khi lượng mưa giảm, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp: bệnh virus lúa, sâu đục thân.

Mía: tiếp tục giai đoạn đẻ nhánh, với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25°C, thống kê cho thấy nhiệt độ tuần 1 tháng 5 dao động từ 23.9 - 32.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 59.7mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do nền nhiệt tương đối cao. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh trắng lá, rệp sáp đỏ; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời như dùng thuốc Supracide 40 EC pha với nước, nồng độ 0,1-0,15% phun ướt đẫm đều thân, bẹ lá. Dự báo tuần sau nhiệt độ tăng so với tuần này, nhiệt độ trung bình dao động từ 30.5-34.5°C, lượng mưa giảm khoảng 30mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh cháy lá, bọ phấn trắng.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.9 - 32.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 59.7mm và dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng, nhiệt độ tối cao dự báo lên đến 40 độ C trong khi lượng mưa dự báo giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh gỉ sắt, sâu đục nõn thông, bệnh thối rễ, côn trùng cánh cứng. Khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể dùng thuốc hoá học như: Carbendazim, Daconil.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 23-30°C, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 23.9 - 32.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 59.7mm, phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng. Theo dự báo nhiệt độ tuần sau có xu hướng tăng và lượng mưa giảm, do đó cần kiểm tra đồng ruộng, đảm bảo đủ nước cho giai đoạn phát triển này của sắn; cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút.

Ngô: trong giai đoạn thu hoạch, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C. Thống kê số liệu khí tượng thực đo từ các trạm trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 23.9 - 32.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 59.7mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần sau lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là rau muống, cà chua, mướp hương... Thống kê khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 23.9 - 32.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 59.7mm, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể khống chế bằng cách phun lên lá các loại thuốc như

Monceren, Benomyl, Carbendazim, Topsin M. hoặc có thể tưới lên đất. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ có xu hướng tăng, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 30.5-34.5°C, lượng mưa giảm (30mm), cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang.

Cây ăn quả có múi: đang trong giai đoạn phát triển quả. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.9 - 32.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 59.7mm, chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông. Nhiệt độ dự báo tuần kế tiếp có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ trĩ.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 35.0-40.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 30.5-34.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 10.0-30.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 35 đến 40 độ C, và lượng mưa giảm khoảng 30cm, cần chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc cây trồng, sử dụng một số biện pháp chống nóng cho cây trồng như: đối với các loại rau màu có thể làm giàn che, lưới che chống nắng nóng, trồng cây dây leo làm bóng mát chống nắng cho rau; đối với các loại cây ăn quả: lắp đặt hệ thống tưới bằng béc hoặc nhỏ giọt cho cây trồng, tưới hàng ngày hoặc 2 ngày tưới một lần đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng