



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
Tuần 1 tháng 5 năm 2021**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 5 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 23.8 - 30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0°C, tổng lượng mưa là 59.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 32.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 11.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 14.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-16/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng giai đoạn chiều tối và đêm ngày 12 đến ngày 14/5 có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều tối ngày 17-18/5, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 19-21/5, có mưa rào và dông rải rác tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm DBKTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.1	22.1	25.6	26.4
Trong tuần	30.3	23.8	27.0	59.3
Tuần tới	34.0-37.0	25.0-28.0	29.5-32.5	30.0-60.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 5 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: diện tích lúa đang giai đoạn chắc xanh và đỏ đuôi; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 25-32°C. Thống kê số liệu khí tượng các trạm trong khu vực cho thấy nền nhiệt độ tuần này dao động từ 23.8 - 30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0°C, tổng lượng mưa là 59.3mm, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Tuy nhiên, cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh thối đen lép lửng, sâu phao; người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phun thuốc kịp thời các diện tích lúa bị nhiễm bệnh như: làm đất, diệt cỏ dại, bón phân cân đối N, P, K, phù hợp với giai đoạn sinh trưởng của cây, không bón quá nhiều đạm, không nên bón đạm muộn vào thời kì lúa trước và sau khi trở bông từ 5-10 ngày nhằm giảm mức độ nhiễm bệnh. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo lớn nhất thay đổi không đáng kể; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh cháy lá, sâu cuốn lá lớn.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái. Số liệu thống kê cho thấy tuần này nhiệt độ không khí dao động từ 23.8 - 30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0°C, tổng lượng mưa là 59.3mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần

này, cần lưu ý các loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh. Số liệu dự báo khu vực Đông Bằng Bắc Bộ tuần tới cho thấy nhiệt độ có xu hướng tăng, nhiệt độ không khí trung bình dao động trong khoảng 29.5-32.5 độ C, lượng mưa thay đổi không đáng kể, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh cháy gôm, rệp sáp bông.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô đang trong giai đoạn phát triển bắp và thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển là 24-30 °C, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy thời tiết tuần này có nhiệt độ không khí dao động từ 23.8 - 30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0°C, tổng lượng mưa là 59.3mm, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; cần chú ý một số bệnh phổ biến: bệnh đốm lá lớn, sâu gai, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun các loại thuốc như Tilt 250ND và Anvil 5SC nồng độ 0,1% để trừ bệnh. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ khu vực có xu hướng tăng và tổng lượng mưa dự báo lớn nhất hầu như không thay đổi so với tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám.

Cây nhãn: đang trong giai đoạn phát triển quả, nhãn là một trong những cây trồng phổ biến ở Hải Dương và Hưng Yên. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 1 tháng 5 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 23.8 - 30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0°C, tổng lượng mưa là 59.3mm. Cần lưu ý bệnh bồ hóng, dơi trong giai đoạn này. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng và lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 30.0-60.0mm, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh thán thư, sâu đục nõn.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 23.8 - 30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0°C, tổng lượng mưa là 59.3mm, cần chú ý một số bệnh: bệnh đốm trắng, bọ xít. Số liệu dự báo cho thấy lượng mưa dự báo lớn nhất là khoảng 60mm, nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè mất lưới, nhện đỏ.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng. Thống kê số liệu tuần 1 tháng 5 có nền nhiệt độ dao động từ 23.8 - 30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0°C, tổng lượng mưa là 59.3mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang, khi phát hiện sâu bệnh có thể dùng các loại thuốc hoá học có chứa hoạt chất Abamectin như Abatin 1.8 EC, Silsau 3.6 EC... Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo lớn nhất không thay đổi đáng kể so với tuần này, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa.

Cây lạc: trong khu vực đang ở giai đoạn phát triển củ. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Lạc là cây trồng chịu hạn song chỉ có khả năng chịu hạn ở một giai đoạn nhất định. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần 1 tháng 5 có nền nhiệt độ dao động từ 23.8 - 30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.0°C, tổng lượng mưa là 59.3mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh lở cổ rễ, rầy mềm. Số liệu dự báo tuần sau trong khu vực cho thấy nhiệt độ

có xu hướng tăng, tổng lượng mưa lớn nhất thay đổi không đáng kể so với tuần này, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 25.0-28.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 29.5-32.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 30.0-60.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng, nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0°C và lượng mưa dự báo lớn nhất không thay đổi đáng kể so với tuần này, cần chú ý lựa chọn biện pháp chăm sóc cây trồng đúng kỹ thuật, đặc biệt chú ý sử dụng biện pháp cho các loại rau màu chịu nóng kém như: làm giàn che, lưới che chống nắng nóng, trồng cây dây leo làm bóng mát chống nắng cho rau, tưới nước phun sương, hoặc tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới bằng đầu béc tưới nhẹ nhàng tránh hồng rau, tưới vào sáng sớm hoặc buổi chiều mát đồng thời sử dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng