



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 5 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 5 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 22.9 - 28.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.7°C, tổng lượng mưa là 81.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 10mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 26.1\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 68.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 16.7\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 03-05/6, có mưa vừa, mưa to và dông từ đêm 03 đến sáng ngày 04/6, sau có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 06-11/6, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm DBKTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.1	23.0	26.0	71.5
Trong tuần	28.6	22.9	25.7	81.5
Tuần tới	34.0-37.0	24.0-27.0	29.0-32.0	100.0-200.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 5 năm 2021 được khái quát như sau:

**Lúa:** Cây lúa mùa sớm trong khu vực đang ở giai đoạn đở đuôi - thu hoạch điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là  $25-30^{\circ}\text{C}$ . Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ  $22.9 - 28.6^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình  $25.7^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là 81.5mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh vằn nâu hại lúa, rầy lưng trắng người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh như sử dụng một số loại thuốc như: Pexena 106 SC, Applaud 10BHN, Oshin 20 WP, Chess 50 WG, Bassa, Tre bon... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa dự báo đều có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh cháy lá, sâu cuốn lá lớn.

**Cây vải:** là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển quả và thu hoạch. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, dao động từ  $22.9 - 28.6^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình  $25.7^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là 81.5mm, phù hợp cho giai đoạn phát triển này của vải. Người dân cần chú ý một số bệnh có khả năng phát triển trong giai đoạn này như: bệnh sương

mai, sâu đục cuống quả, khi phát hiện diện tích nhiễm sâu bệnh có thể sử dụng thuốc nội hấp, lưu dẫn có hoạt chất Chlorantraniliprole + Abamectin như Voliam targo 063SC, Nouvo 3.6EC, Shepatin 18EC; hoặc hoạt chất Cypermethrin như thuốc Secsaigon 25 EC... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ có xu hướng tăng (nhiệt độ trung bình dự báo tăng từ 29.0-32.0°C), lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng tăng với lượng mưa dự báo từ 100.0-200.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ xít.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả, thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp. Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 22.9 - 28.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.7°C, tổng lượng mưa là 81.5mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép như thuốc trừ sâu gốc Abamectin với dầu khoáng Petroleum Spray Oil hoặc thuốc gốc Cyromazine... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng dự báo trong khoảng 29.0-32.0°C, đồng thời lượng mưa dự báo tăng dự báo trong khoảng 100.0-200.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh tàn lụi, sâu đục trái.

Cây ngô xuân: đang ở giai đoạn phát triển bắp - thu hoạch, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C. Theo số liệu các trạm khí tượng trong khu vực, nhiệt độ trong tuần này dao động từ 22.9 - 28.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.7°C, tổng lượng mưa là 81.5mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng (nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0°C), lượng mưa có xu thế tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân.

Cây rau màu khu vực Đông Bắc: đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng. Thống kê số liệu khí tượng cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 22.9 - 28.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.7°C, tổng lượng mưa là 81.5mm, nền nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh chết cây con, sâu xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Biocin 16WP; Olong 55WP; Biocin 8000SC; Vi-BT; Xentari 15FC; Delfin WG... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại sâu: nhện đỏ, sâu đục quả.

Cây lạc: đang giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 22.9 - 28.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.7°C, tổng lượng mưa là 81.5mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần phù hợp với giai đoạn phát triển của lạc, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muộn, sâu ăn lá. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng trong

khoảng 29.0-32.0°C và lượng mưa dự báo có xu thế tăng với lượng mưa dự báo trong khoảng 100.0-200.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh lở cổ rễ, rầy mềm.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0 °C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 29.0-32.0 °C, tổng lượng mưa dự báo từ 100.0-200.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng, cần lựa chọn biện pháp chăm sóc cây trồng và phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**