



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 1 tháng 6 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 6 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 23.2 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.2°C, tổng lượng mưa là 89.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 7.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 23.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 25.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 11.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ chiều và đêm 12-14/6, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 15-16/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 16, khu vực trung du, đồng bằng có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 17-21/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm DBKTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.6	22.9	25.7	81.5
Trong tuần	29.3	23.2	26.2	89.2
Tuần tới	33.0-36.0	23.0-26.0	28.0-31.0	80.0-150.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 1 tháng 6 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: lúa mùa sớm trong khu vực đang ở giai đoạn đở đuôi - thu hoạch, điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là 25-30°C. Theo thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực, nhiệt độ tuần này dao động từ 23.2 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.2°C, tổng lượng mưa là 89.2mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh đạo ôn, sâu gai; người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như: Filia 52.5 SE, Beam 75 WP, Flash 75 WP, Fuan 40 EC, Fuji One 40 EC, Rabcide 20 SC... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa dự báo có xu hướng tăng, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh cháy lá, sâu cuốn lá lớn.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển quả, thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn phát triển này của

vải là 24-29°C. Theo số liệu thống kê từ các trạm khí tượng thực đo trong khu vực, nhiệt độ tuần này dao động từ 23.2 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.2°C, tổng lượng mưa là 89.2mm, có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển này của vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý bệnh sương mai, sâu đục cuống quả. Số liệu dự báo tuần tới cho thấy nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng với nhiệt độ dự báo trung bình trong khoảng 28.0-31.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 80.0-150.0mm, cần chú ý một số sâu bệnh: bệnh cháy lá, côn trùng cánh cứng.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả. Nhiệt độ thích hợp cho cây trong giai đoạn này là 23-29°C, thống kê số liệu cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 23.2 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.2°C, tổng lượng mưa là 89.2mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần chú ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh ghê nám, bệnh loét khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép như sử dụng vắc xin kết hợp với siêu đồng để phun sát khuẩn, diệt nấm và tăng đề kháng cho cây giúp ngăn ngừa tái phát, phun 2 lần, cách nhau 3-5 ngày. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên dự báo trong khoảng 28.0-31.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 80.0-150.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông.

Cây ngô: đang ở giai đoạn xuân phát triển bắp - thu hoạch, nhiệt độ thích hợp từ 25- 30°C, theo số liệu thống kê từ các trạm đo trong khu vực, nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 23.2 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.2°C, tổng lượng mưa là 89.2mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần chú ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân; người dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả, có thể sử dụng một số biện pháp như: sử dụng thuốc Vibasu 10H hoặc Diazan 10H. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa có xu thế tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh đốm lá lớn, sâu gai.

Cây rau màu khu vực Đông Bắc: đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 23.2 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.2°C, tổng lượng mưa là 89.2mm, nên nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần chú ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh xoắn trùn ngọn, bọ nhảy. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ tối cao tăng lên dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C và lượng mưa dự báo tăng; cần lưu ý một số loại sâu: sâu xanh, sâu cuốn lá.

Cây lạc: đang giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 23.2 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.2°C, tổng lượng mưa là 89.2mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh

đốm lá muện, rầy mềm. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ và lượng mưa tuần sau có xu hướng tăng; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.0-31.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 80.0-150.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng, nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33 đến 36°C và lượng mưa tăng, người dân cần lựa chọn biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp đồng thời áp dụng các phương pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng