



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC ĐÔNG BẮC
Tuần 3 tháng 6 năm 2021**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 6 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 25.1 - 31.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 111.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 33.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 37.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 56.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-04/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng chiều tối và đêm 04/7 vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 05-08/7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng ngày 05/7 vùng đồng bằng và trung du ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 09-11/7, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm DBKTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.0	24.6	26.8	78.1
Trong tuần	31.2	25.1	28.1	111.7
Tuần tới	35.0-38.0	24.0-27.0	29.5-32.5	40.0-70.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 6 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa mùa sớm trong khu vực đang ở giai đoạn cây, hồi xanh điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là 25-28°C. Theo thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực, nhiệt độ tuần này dao động từ 25.1 - 31.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 111.7mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu không thực sự thuận lợi với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh lùn xoắn lá, sâu cuốn lá nhỏ người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh như: Regent 800WP, Sumithion 50EC, Karate 2.5EC... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng (nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 29.5-32.5°C), lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh tuyến trùng hại rễ, rầy nâu.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn thu hoạch. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận

lợi, dao động từ 25.1 - 31.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 111.7mm, phù hợp cho giai đoạn thu hoạch cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần chú ý bệnh thối rễ, bọ xít. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ có xu hướng tăng (nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 35.0-38.0 °C), trong khi lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh sương mai, sâu đục cuống quả.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả. Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 25.1 - 31.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 111.7mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần chú ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép như sử dụng các loại thuốc trừ sâu vi sinh có chứa các chủng vi sinh như: *Bacillus thuringiensis*, *Bacillus sphaericus*, *Beauveria bassiana*... Số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ có xu hướng tăng, đồng thời lượng mưa dự báo giảm (khoảng 50mm) cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh tàn lụi, sâu đục trái.

Cây ngô hè thu: đang ở giai đoạn hè thu gieo -7 lá, nhiệt độ thích hợp từ 25 - 30°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 25.1 - 31.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 111.7mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần chú ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám, người dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả, có thể sử dụng một số loại thuốc như: Diptere 80WP + Karate 2,5EC; Sevin 40% + Sherpa 25EC; Ganoi 95SP + Abamectin 36EC, Regent 800WG + Sokupi 0,36AS... Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa có xu thế giảm với tổng lượng mưa khoảng 50mm, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh ung thư ngô, sâu xanh đục trái.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 25.1 - 31.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 111.7mm, nền nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần chú ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh chết cây con, sâu xanh. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng (nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 29.6-32.5°C) và lượng mưa giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa.

Cây sắn: đang giai đoạn phát triển thân lá. Cây sắn phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 20-32 độ C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 25.1 - 31.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.1°C, tổng lượng mưa là 111.7mm, cần chú ý bệnh héo khô trên thân, sâu ăn tạp.

Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí có xu hướng tăng và lượng mưa giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 35.0-38.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 29.5-32.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 40.0-70.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng, nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 35 đến 38 độ C và lượng mưa giảm (dự báo lượng mưa tuần kế tiếp giảm khoảng 30 - 70 mm so với tổng lượng mưa tuần này), người dân nên áp dụng biện pháp chống nóng cho cây trồng như phủ rạ mặt ruộng, làm giàn che lưới và thường xuyên duy trì nước trong rãnh giữa các luống để làm mát đất..., đồng thời áp dụng các phương pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng