



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP  
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ  
Tuần 3 tháng 6 năm 2021**

**I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp**


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 6 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 26.4 - 35.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.7°C, tổng lượng mưa là 77.0mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng  $0.8^\circ\text{C}$  tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng  $1.2^\circ\text{C}$ . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng  $1.4^\circ\text{C}$  tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng  $1.2^\circ\text{C}$ . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng  $0.1^\circ\text{C}$  tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 25.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 22$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 22mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 5$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-05/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng ngày 05 ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 05-08/7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 09-11/7, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm DBKTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}$ C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	33.9	27.6	30.7	102.3
Trong tuần	35.1	26.4	30.7	77.0
Tuần tới	35.0-38.0	25.0-28.0	30.0-33.0	40.0-70.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 6 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: đang giai đoạn hồi xanh - đẻ nhánh; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là  $25-31^{\circ}$ C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực cho thấy nền nhiệt độ tuần này dao động từ  $26.4 - 35.1^{\circ}$ C, nhiệt độ không khí trung bình  $30.7^{\circ}$ C, tổng lượng mưa là 77.0mm, tương đối cao cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực, cần chú ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh đạo ôn, sâu đục thân; người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phun thuốc kịp thời các diện tích lúa bị nhiễm bệnh, có thể sử dụng một số loại thuốc như: Ninja 35SE, Filia 525SE, Trizole 75UG. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo trong khoảng 40.0-70.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, số liệu thống kê từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ không khí dao động từ  $26.4 - 35.1^{\circ}$ C, nhiệt độ không khí trung bình  $30.7^{\circ}$ C, tổng lượng mưa là 77.0mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần chú ý các loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như:

Ofatox 400EC, Fastac 5EC, Padan 95 SP; Cyperan 5EC/10EC hoặc 25EC... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ có xu hướng tăng (nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C), lượng mưa dự báo trong khoảng 40.0-70.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh thối rễ, bọ trĩ.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô hè thu đang trong giai đoạn 7 đến 9 lá, nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn này là 20-30°C. Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 26.4 - 35.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.7°C, tổng lượng mưa là 77.0mm, nền nhiệt tương đối cao cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; cần chú ý một số sâu bệnh phổ biến: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế tăng (nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 35.0-38.0°C) và tổng lượng mưa dự báo trong khoảng 40.0-70.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá.

Cây nhãn: là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên, nhãn đang trong giai đoạn phát triển quả, một số diện tích bắt đầu thu hoạch. Thống kê số liệu khí tượng tuần 3 tháng 6 cho thấy nhiệt độ dao động từ 26.4 - 35.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.7°C, tổng lượng mưa là 77.0mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh phấn trắng, xén tóc trong giai đoạn này. Theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng (nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C) và lượng mưa dự báo trong khoảng 40.0-70.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh bồ hóng, dơi.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó, ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 26.4 - 35.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.7°C, tổng lượng mưa là 77.0mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh phòng lá chè, rầy xanh. Số liệu dự báo trong khu vực cho thấy, nhiệt độ tuần tiếp theo có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 40.0-70.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm xám, nhện nâu.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, thống kê số liệu khí tượng tuần 3 tháng 6 khu vực có nền nhiệt độ dao động từ 26.4 - 35.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.7°C, tổng lượng mưa là 77.0mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Silsau super 1.9,3.5EC; Tasieu 1.9EC; 5WG; TC-Năm sao 20EC, 35EC; Reasant 3.6EC... Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh bạch tạng, sâu xám.

Cây sắn: trong khu vực đang ở giai đoạn phát triển thân lá. Nhiệt độ thích hợp cho sắn phát triển là 20-32°C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 26.4 - 35.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.7°C, tổng lượng mưa là 77.0mm, nền nhiệt đối với giai đoạn phát triển này của sắn, cần chú ý bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo có xu hướng tăng (nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C) và lượng mưa

dự báo trong khoảng 40.0-70.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 35.0-38.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 25.0-28.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 40.0-70.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng, nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 35 đến 38 độ C, người dân có thể sấp cụng một số biện pháp chống nóng cho cây trồng khi nhiệt độ tăng cao như: trồng cây dây leo làm bóng mát chống nắng cho rau, tưới nước phun sương, hoặc tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới bằng đầu béc tưới nhẹ nhàng tránh hư rau, tưới vào sáng sớm hoặc buổi chiều mát đồng thời áp dụng các phương pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**