



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP  
KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ  
Tuần 2 tháng 8 năm 2021**

**I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp**


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 8 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 26.9 - 35.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.1°C, tổng lượng mưa là 65.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 32.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 21.9\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 29.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 8.3\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 22-25/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 25/8-28/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 29/8-01/9, có mưa rào và dông vài nơi. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	34.5	28.5	31.5	32.7
Trong tuần	35.4	26.9	31.1	65.6
Tuần tới	34.0-37.0	24.0-27.0	29.0-32.0	70.0-120.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 8 năm 2021 được khái quát như sau:

**Lúa:** đang trong giai đoạn chín sấp - thu hoạch, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này từ  $20-32^{\circ}\text{C}$ . Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ  $26.9 - 35.4^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình  $31.1^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là 65.6mm, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết tuần này không thật sự phù hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính như: bệnh tuyến trùng hại rễ, rầy nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Osago 80WG (Nitenpyram 20% + Pymetrozine 60%), Butyl (Buprofezin) 10WP, 400SC, Bascide (Fenobucarb) 50EC... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu thế tăng, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp như: bệnh lùn xoắn lá, sâu cuốn lá nhỏ.

**Mía:** tiếp tục giai đoạn vươn lóng với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là  $20-25^{\circ}\text{C}$ . Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần 2 tháng 8 dao động từ  $26.9 - 35.4^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí trung bình  $31.1^{\circ}\text{C}$ , tổng lượng mưa là 65.6mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do nền nhiệt tương đối cao, cần chú ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh xoắn cổ lá, sâu đục thân bốn vạch; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Carbendazol WP, 50%

benomyl WP, dung dịch đồng béc đô,... Dự báo tuần sau nhiệt độ và lượng mưa có xu thế tăng, nhiệt độ trung bình dự báo dao động từ 29.0- 32.0°C, lượng mưa tăng trong khoảng 70.0-120.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh bồ hóng, sâu đục thân mình tím.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này. Số liệu thống kê từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.9 - 35.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.1°C, tổng lượng mưa là 65.6mm và dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh tuyến trùng, sâu róm thông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như dùng máy phun mù nhiệt SS-150F phun hóa chất Eco Cyper 350EC, Banectin 1.8EC, Catex 1.8 EC, ...

Sắn: Diện tích sản trong khu vực ở giai đoạn phát triển củ với nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C. Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 26.9 - 35.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.1°C, tổng lượng mưa là 65.6mm, thời tiết phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối củ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ bệnh có gốc đồng, nhóm thuốc có Carbendazim (thuốc Carmanthai 80 WP), hoặc kasumin. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng với lượng mưa dự báo trong khoảng 70.0-120mm cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp.

Ngô: trong giai đoạn mới gieo và một phần diện tích ở giai đoạn trổ cờ. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.9 - 35.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.1°C, tổng lượng mưa là 65.6mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Dùng chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma ủ với phân chuồng bón cho ngô, lượng dùng 80 – 100 kg/ha, phun trừ bệnh bằng thuốc Validamicin 3 SC, pha nồng độ 0,2-0,25. Dự báo tuần sau lượng mưa và nhiệt độ tăng so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là rau ngót, bí xanh, bầu... Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 26.9 - 35.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.1°C, tổng lượng mưa là 65.6mm. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh chết cây con, sâu xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Validamycin, Pencycuron, Bacillus subtilis,... Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ tăng (nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0°C), lượng mưa dự báo trong khoảng 70.0-120.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa.

Cây ăn quả có múi: đang ở giai đoạn phát triển quả, chín sinh lý. Thông kê số liệu các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.9 - 35.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.1°C, tổng lượng mưa là 65.6mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc có hoạt chất Benomyl, Mantalaxyl hoặc Propiconazole+Difenoconazole. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng tăng; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ nám, bệnh loét.


Thông kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 29.0-32.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 70.0-120.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, cây trồng cần được chú ý lựa chọn kỹ thuật chăm sóc phù hợp từng loại cây và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**