



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 2 tháng 8 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 8 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 24.1 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C, tổng lượng mưa là 263.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 180mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 68.4\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 158.1mm, tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 8.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 22-24/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm 23/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng, ngày 24/8 có nơi nắng nóng. Từ đêm 24-26/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung từ chiều tối đến sáng). Từ ngày 27-29/8, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 30/8-01/9, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	30.4	25.1	27.7	83.1
Trong tuần	29.4	24.1	26.7	263.1
Tuần tới	32.0-35.0	23.0-26.0	27.5-30.5	80.0-130.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 8 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: Lúa mùa sớm trong khu vực đang ở giai đoạn làm đòng - trở với điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là $20-30^{\circ}\text{C}$. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ $24.1 - 29.4^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C , tổng lượng mưa là 263.1mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh vàng lụi, sâu đục thân hai chấm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc: DuponTMprevathon 5SC, Virtako 40WG, Alocbale 40EC, Regent 800WG, Enasin 32WP... Số liệu dự báo tuần kế tiếp cho thấy nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo giảm, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh cháy lá, sâu cuốn lá lớn.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển lộc. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, nhiệt độ dao động từ $24.1 - 29.4^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C , tổng lượng mưa là 263.1mm, phù hợp cho giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi và phát triển lộc

trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần chú ý bệnh cháy lá, côn trùng cánh cứng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Boócđô 1%, Alirette 80WP 0,3%, Rovral 50 WP, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ dự báo có xu thế tăng với nhiệt độ trung bình dự báo dao động từ 27.5-30.5°C và lượng mưa dự báo giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ xít.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 24.1 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C, tổng lượng mưa là 263.1mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi; cần chú ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Aliette 80WP, Ridomil MZ 72WP, Ridomil Gold 68 WP... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên trong khoảng 27.5-30.5 độ C, đồng thời lượng mưa dự báo giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa.

Cây ngô: Ngô ở giai đoạn bắp non, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 24.1 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C, tổng lượng mưa là 263.1mm, có thể thấy điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần chú ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh ung thư ngô, sâu xanh đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: WPBayfidan 25EC hoặc 250EC... Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng trong khi lượng mưa dự báo có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 24.1 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C, tổng lượng mưa là 263.1mm, nên nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần chú ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Saikumi 39.35SC, Sec Saigon 25EC, Sape Alpha 5EC, Comda Gold 5WG... Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ tăng với nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 32.0-35.0°C đồng thời lượng mưa dự báo giảm, cần lưu ý một số loại sâu: sâu xanh, sâu cuốn lá.

Cây sắn: đang giai đoạn phát triển thân lá với nhiệt độ thích hợp từ 20-32°C. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 24.1 - 29.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 26.7°C, tổng lượng mưa là 263.1mm; cần chú ý một số sâu bệnh trong tuần này như bệnh thối củ sắn, rệp sáp; khi phát hiện diện

tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ bệnh có gốc đồng, nhóm thuốc có Carbendazim (thuốc Carmanthai 80 WP), hoặc kasumin. Theo số liệu dự báo tuần tới có nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 32.0-35.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 80.0-130.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm tương đối nhiều, cây trồng trong khu vực cần được chăm sóc đúng kỹ thuật đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng