



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 8 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 8 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 24.2 - 30.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 124.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.0^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 138.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 36.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 9.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 03-06/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 07-11/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.4	24.1	26.7	263.1
Trong tuần	30.0	24.2	27.1	124.3
Tuần tới	32.0-35.0	22.0-25.0	27.0-30.0	90.0-140.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 8 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa mùa sớm trong khu vực: đang ở giai đoạn trổ - phơi màu, điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là 25-32°C. Theo thống kê từ số liệu các trạm đo trong khu vực, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 24.2 - 30.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 124.3mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh virus lúa, sâu đục thân; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc: Applaud-bas 27BTN, Applaud mipc 25BTN ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa khu vực Đông Bắc có xu hướng tăng, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh khô vằn, bọ xít dài.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phục hồi, phát triển lộc. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, dao động từ 24.2 - 30.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 124.3mm, phù hợp cho giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi và phát triển lộc trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý bệnh thối rễ, bọ xít; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Actara 25EC; Sutin 5EC; Oshin 20WP; Cruiser plus 312,5PS, ... Số liệu dự báo cho

thấy nhiệt độ và lượng mưa có xu thế tăng với nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.0-30.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh sương mai, cháy lá.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, điều kiện khí tượng tuần này dao động từ 24.2 - 30.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 124.3mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần chú ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc có hoạt chất Benomyl, Mantalaxyl hoặc Propiconazole+Difenoconazole. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình dự báo trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 90.0-140.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh.

Cây ngô: đang ở giai đoạn phát triển bắp, nhiệt độ thích hợp từ 22 - 25°C. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 24.2 - 30.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 124.3mm, có thể thấy điều kiện thời tiết không phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần chú ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh khô vằn, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Dùng chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma ủ với phân chuồng bón cho ngô, lượng dùng 80 - 100 kg/ha, phun trừ bệnh bằng thuốc Validamicin 3 SC, pha nồng độ 0,2-0,25%. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C. Thống kê số liệu từ các trạm thực đo cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 24.2 - 30.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 124.3mm, nên nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần chú ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Basudin 50EC; Shecpain 36EC; Gottoc 250EC, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình dự báo tăng lên trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 90.0-140.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: nhện đỏ, sâu đục quả.

Cây sắn: đang giai đoạn phát triển thân lá. Cây sắn phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Thống kê số liệu từ các trạm thực đo cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 24.2 - 30.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 124.3mm, cần chú ý một số sâu bệnh trong tuần này như rệp sáp, bệnh khảm vi rút; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Brimgold 200WP, Enspray 99EC, Sairifos 585EC, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 32.0-35.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 22.0-25.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.0-30.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 90.0-140.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng, người dân cần được chú ý lựa chọn kỹ thuật chăm sóc phù hợp cho từng loại cây và có biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng