



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 7 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 7 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 26.9 - 31.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C, tổng lượng mưa là 154.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng .9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm .9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm .5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 119.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 24.4\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 79.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 8.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 03-07/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Từ ngày 08-11/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	34.4	26.9	30.7	34.8
Trong tuần	31.4	26.9	29.1	154.5
Tuần tới	33.0-36.0	24.0-27.0	28.5-31.5	50.0-100.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 7 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ: đang ở giai đoạn đứng cái - trổ; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là $28-30^{\circ}\text{C}$. Thống kê số liệu nền nhiệt độ tuần này dao động từ $26.9 - 31.4^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C , tổng lượng mưa là 154.5mm, thời tiết tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Tuy nhiên, cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh vân nâu hại lúa, rầy lưng trắng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Actara 25WG, Asarasuper 250WDG, Wofara 300WG, Onera 300WG... Số liệu dự báo tuần kế tiếp cho thấy nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh tuyền trùng hại thân lúa, sâu năn.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả và thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ $26.9 - 31.4^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C , tổng lượng mưa là 154.5mm, cần chú ý các loại sâu bệnh như: bệnh ghê nám, bệnh loét; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Funguran, COC 85, Norshield 86.2 WG,... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình dự báo trong khoảng $28.5-31.5^{\circ}\text{C}$, lượng mưa dự báo trong khoảng 50.0-100.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh sọc, rệp sáp.

Cây ngô: đang ở giai đoạn trổ cờ với nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn này là 24-30°C. Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 26.9 - 31.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C, tổng lượng mưa là 154.5mm; cần chú ý một số bệnh như: bệnh phấn đen, châu chấu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Thiram 85 WP, Tiptop 250 EC, ... Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu thế tăng với nhiệt độ tối cao dự báo dao động trong khoảng 33.0-36.0°C và tổng lượng mưa dự báo trong khoảng 50.0-100.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám.

Cây nhãn: là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên, đang trong giai đoạn phát triển quả, thu hoạch. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 3 tháng 7 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 26.9 - 31.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C, tổng lượng mưa là 154.5mm, cần chú ý bệnh bồ hóng, dơi; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như bao chùm trái bằng bao giấy, bao vải, bao Nilon, bao lá dừa nước kết lại; nên thu hái trái tập trung dứt điểm cho từng cây, từng vườn trong ngày; có thể dùng tấm lưới Nilon bao chùm hết cả cây nhãn hoặc trùm kín những khu vực có nhiều trái trong giai đoạn này. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng và lượng mưa giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thán thư, sâu đục cuống quả.

Cây chè: tiếp tục trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó, ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.9 - 31.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C, tổng lượng mưa là 154.5mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm nâu, bọ cánh tơ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Midan 10WP, Anisaf SH-01 nồng độ 1%, Mospilan 3EC, ... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm trắng, bọ xít.

Cây rau màu trong khu vực: đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 3 tháng 7 có nền nhiệt độ dao động từ 26.9 - 31.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C, tổng lượng mưa là 154.5mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: nhện đỏ, sâu đục quả; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Sagosuper, Karate, Pyrinex, Diaphos, Sherzol, BayFidan,... Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng tăng nhẹ trong khi lượng mưa dự báo giảm với lượng mưa dự báo trong khoảng 50.0-100.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh xoắn trùn ngọn, bọ nhảy.

Cây sắn trong khu vực: đang ở giai đoạn phát triển thân lá. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực, nhiệt độ tuần này dao động từ 26.9 - 31.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C, tổng lượng mưa là 154.5mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như bệnh thối củ sắn, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ bệnh có gốc đồng, nhóm thuốc có Carbendazim (thuốc Carmanthai 80 WP), hoặc kasumin. Số liệu dự báo tuần kế tiếp cho thấy nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ với nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.5-31.5 °C, tổng lượng mưa dự báo từ 50.0-100.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ thay đổi không đáng kể, lượng mưa dự báo giảm, người dân cần lựa chọn các biện pháp chăm sóc và phòng chống sâu bệnh hiệu quả và phù hợp.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng