



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 8 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 8 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 28.6 - 34.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.3°C, tổng lượng mưa là 23.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.8^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 130.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 6.8$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 76.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 10$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 13-18/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng thời kỳ ngày 14-15/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 19-21/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31.4	26.9	29.1	154.5
Trong tuần	34.1	28.6	31.3	23.8
Tuần tới	33.0-36.0	26.0-29.0	29.5-32.5	70.0-130.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 8 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: đang giai đoạn đứng cái - làm đòng; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 20-38°C. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt độ tuần này dao động từ 28.6 - 34.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.3°C, tổng lượng mưa là 23.8mm, tương đối phù hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Tuy nhiên, cần chú ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh cháy lá, sâu cuốn lá lớn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Sumithion 50EC, Karate 2.5EC... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng tăng, với lượng mưa dự báo trong khoảng 70.0-130.0mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh tuyến trùng hại thân lúa, sâu năn.

Cây ăn quả có múi khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ: đang trong thời kỳ phát triển quả và thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy tuần này nhiệt độ không khí dao động từ 28.6 - 34.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.3°C, tổng lượng mưa là 23.8mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần chú ý các loại sâu bệnh như: bệnh ghè lõm, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như cắt tia cành, cắt tia cành đồng loạt sẽ giúp đợt non ra đồng loạt giúp kiểm soát sâu vẽ bùa hiệu quả cao nhất. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí

trung bình dự báo trong khoảng 29.5-32.5°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 70.0-130.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh đốm đen, bọ xít xanh.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô ở trong giai đoạn trổ cờ - phun râu với nhiệt độ thích hợp từ 20-30°C. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này dao động từ 28.6 - 34.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.3°C, tổng lượng mưa là 23.8mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Manthane M46, Juliet 80WP phun kỹ, Foraxyl 35 WP,... Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ và tổng lượng mưa dự báo tăng so với tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân.

Cây nhãn: là cây trồng chủ đạo ở Hưng Yên và Hải Dương, hiện nay nhãn đang trong giai đoạn thu hoạch. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 1 tháng 8 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 28.6 - 34.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.3°C, tổng lượng mưa là 23.8mm; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rỉ, sâu đục gân lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như phun thuốc gốc Mancozeb hoặc Propineb trong giai đoạn này. Theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng với nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh khô cành, sâu đục nõn.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó, ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ nhiệt độ tuần này dao động từ 28.6 - 34.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.3°C, tổng lượng mưa là 23.8mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh phòng lá chè mất lưới, nhện đỏ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Manage 5WP, Starsuper 20Wp, ... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ và lượng mưa có xu thế tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm trắng, bọ xít.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, thống kê số liệu khí tượng tuần 1 tháng 8 có nền nhiệt độ dao động 28.6 - 34.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.3°C, tổng lượng mưa là 23.8mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Validacin, Bonanza,... Dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa dự báo có xu hướng tăng với lượng mưa dự báo trong khoảng 70.0-130.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh chết cây con, sâu xanh.

Cây sắn: trong khu vực đang ở giai đoạn phát triển thân lá. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ nhiệt độ tuần này dao động từ 28.6 - 34.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.3°C, tổng lượng mưa là 23.8mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Brimgold 200WP, Enspray 99EC, Sairifos 585EC, ... Theo số liệu dự báo,

nhiệt độ và lượng mưa tuần tiếp theo có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 29.5-32.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 70.0-130.0mm, có thể nhận thấy nhiệt độ và lượng mưa tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có xu hướng tăng, người dân cần áp dụng kỹ thuật chăm sóc cây trồng hợp lý đồng thời áp dụng các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**