



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 12 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 12 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 10.8 - 17.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.3°C, tổng lượng mưa là 9.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 4.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 3.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 9.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 05-06/01, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét. Từ đêm 06-08/01, có mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 09-12/01, có mưa nhỏ vài nơi, riêng vùng núi có mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, rét hại. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	15.4	12.9	14.1	7.8
Trong tuần	17.9	10.8	14.3	9.2
Tuần tới	18.5	7.1	12.8	0.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 12 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa Đông Xuân 2020 - 2021 trong khu vực đang trong các giai đoạn sau: mạ chiêm xuân sớm ở giai đoạn gieo - 3 lá, lúa sạ ở giai đoạn gieo - đẻ nhánh. Nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển là 25-30°C. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 10.8 - 17.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.3°C, tổng lượng mưa là 9.2mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu không phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh thối thân, sâu đục thân hai chấm người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí có xu hướng giảm, lượng mưa dự báo tuần tới giảm, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: sâu năn, sâu phao. Để chống rét cho mạ, sử dụng biện pháp kỹ thuật che phủ nilông cho mạ là biện pháp chống rét hữu hiệu nhất.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển lộc - chăm sóc. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này nhiệt độ tương đối thấp, dao động từ 10.8 - 17.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.3°C, tổng lượng mưa là 9.2mm. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý bệnh sương mai, bọ xít. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng

mưa đều có xu hướng giảm, do đó lưu ý một số sâu bệnh: bệnh thối rễ, nhện lông nhung.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, điều kiện khí tượng tuần này dao động từ 10.8 - 17.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.3°C, tổng lượng mưa là 9.2mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa đều giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh ghẻ nám, bệnh loét.

Cây ngô: Ngô ở giai đoạn phun râu - phát triển bắp, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C và thích hợp nhất từ 25-28°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 10.8 - 17.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.3°C, tổng lượng mưa là 9.2mm, có thể thấy điều kiện thời tiết không thực sự phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh mốc hồng hạt ngô, sâu cắn lá; người dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa có xu thế giảm, do đó cần lưu ý một số sâu bệnh: bệnh gỉ sắt ngô, mọt hại.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, tuần này nhiệt độ dao động từ 10.8 - 17.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.3°C, tổng lượng mưa là 9.2mm. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: nhện đỏ, sâu đục quả. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa đều có xu hướng giảm, có thể nhận định điều kiện thời tiết tuần sau không thuận lợi cho sự phát triển một số loại rau màu nhất là các loại rau chịu rét kém; cần lựa chọn biện pháp chống rét cho rau màu hiệu quả đồng thời lưu ý một số loại sâu: bệnh chết cây con, sâu xanh.

Cây lạc đang giai đoạn phát triển củ và thu hoạch. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Lạc là cây trồng chịu hạn song chỉ có khả năng chịu hạn ở một giai đoạn nhất định. Nước là yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, đặc biệt ở thời kỳ sinh trưởng sinh thực bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt. Theo số liệu thống kê, tuần này nhiệt độ dao động từ 10.8 - 17.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.3°C, tổng lượng mưa là 9.2mm, cần chú ý một số sâu bệnh: bệnh lở cổ rễ, rầy mềm. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá muộn, sâu ăn lá.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 7.1 - 18.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 12.8°C, tổng lượng mưa là 0.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm, các cây trồng cần được chú ý biện pháp phòng chống rét và sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng