



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 12 năm 2020

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 12 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 15.8 - 22.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.0°C, tổng lượng mưa là 2.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.4^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.4^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.8^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 6.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.4^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 0.7$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 05-06/01, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét. Từ đêm 06-08/01, có mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 09-12/01, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	21.4	16.5	18.9	5.0
Trong tuần	22.2	15.8	19.0	2.3
Tuần tới	20.1	9.4	14.7	0.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 12 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây lúa: theo thống kê tuần 3 tháng 12 diện tích lúa mạ chiêm xuân sớm đang ở giai đoạn 3 lá, diện tích lúa sạ ở giai đoạn đẻ nhánh; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 25-30°C, nền nhiệt độ tuần này dao động từ 15.8 - 22.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.0°C, tổng lượng mưa là 2.3mm, không thực sự phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh lùn xoắn lá, sâu cuốn lá nhỏ; người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phun thuốc kịp thời các diện tích lúa bị nhiễm bệnh. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh tuyến trùng hại rễ, rầy nâu.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí dao động từ 15.8 - 22.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.0°C, tổng lượng mưa là 2.3mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần lưu ý các loại sâu bệnh như: bệnh thán thư, nhện. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí và lượng mưa có xu hướng giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ trĩ.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô ở giai đoạn phát triển bắp và thu hoạch, thời tiết tuần này có nhiệt độ dao động từ 15.8 - 22.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.0°C, tổng lượng mưa là 2.3mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này tương đối phù hợp cho cây ngô phát triển; lưu ý một số bệnh phổ biến: bệnh gỉ sắt ngô, mọt hại. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng giảm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám.

Cây nhãn: đang trong giai đoạn phát triển lộc - chăm sóc. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 3 tháng 12 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 15.8 - 22.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.0°C, tổng lượng mưa là 2.3mm. Cần lưu ý bệnh thán thư, sâu đục nõn trong giai đoạn này. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Theo dự báo nhiệt độ và lượng mưa tuần tới có xu hướng giảm, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh phấn trắng, xén tóc.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái - đốn, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, nhiệt độ trong tuần dao động từ 15.8 - 22.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.0°C, tổng lượng mưa là 2.3mm, lưu ý một số bệnh: bệnh đốm nâu, nhện nâu. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ và lượng mưa tuần tiếp theo giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm xám, bọ cánh tơ.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 3 tháng 12 có nền nhiệt độ dao động từ 15.8 - 22.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.0°C, tổng lượng mưa là 2.3mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh xoắn trùn ngọng, bọ nhảy. Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh chết cây con, sâu xanh, đồng thời cần chú ý biện pháp chống rét cho rau màu, đặc biệt các cây có khả năng chịu rét kém, khi có sương muối cần che bằng nilong với rau ăn lá và phun nước lên mặt lá với rau ăn củ; với các loại rau ăn quả như cà chua, bí đỏ...khi thời tiết dưới 15 độ C cần tía thưa cành, nhánh hợp lý, tiến hành thụ phấn nhân tạo, thụ phấn bổ sung.

Cây lạc: trong khu vực đang ở giai đoạn phát triển củ và thu hoạch. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Lạc là cây trồng chịu hạn song chỉ có khả năng chịu hạn ở một giai đoạn nhất định. Nước là yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, đặc biệt ở thời kỳ sinh trưởng sinh thực bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt. Theo thống kê, tuần này nhiệt độ dao động từ 15.8 - 22.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.0°C, tổng lượng mưa là 2.3mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ và lượng mưa có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh lở cổ rễ, rầy mềm.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 9.4 - 20.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 14.7°C, tổng lượng mưa là 0.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tiếp tục giảm do đó, bên cạnh việc chống sâu bệnh hiệu quả thì người nông dân cần áp dụng các phương pháp chống rét cho cây trồng như phủ ni lông, bạt đèn sưởi...

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**