



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 1 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 1 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 14.8 - 22.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.4°C, tổng lượng mưa là 2.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 0.8\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 03-08/02, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 08-10/02, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	17.9	12.1	15.0	1.5
Trong tuần	22.0	14.8	18.4	2.6
Tuần tới	21.7	15.8	18.7	1.4

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 1 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: theo thống kê tuần 3 tháng 1 diện tích lúa sạ đang ở giai đoạn đẻ nhánh và tĩa dặm; lúa cấy giai đoạn cấy, bén rễ - hồi xanh và đẻ nhánh; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là $25-32^{\circ}\text{C}$, nên nhiệt độ tuần này dao động từ $14.8 - 22.0^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 18.4°C , tổng lượng mưa là 2.6mm, không phù hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần bên cạnh việc phòng chống một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh thối góc, sâu cuốn lá lớn, thì người dân cần áp dụng một số biện pháp chống rét cho lúa như: điều tiết nước để giữ ẩm cho lúa. Đối với lúa gieo sạ, từ lúc gieo đến lúc được 3- 4 lá chỉ cần tưới ẩm đến độ ẩm bão hòa (mặt ruộng không có nước, nhắm mềm chân). Lúa mới cấy đến lúc sau cấy 30 ngày và lúa sạ giai đoạn 5 lá đến 40 ngày, sau sạ cho nước ngập 3- 5 cm để thúc đẻ và chống rét cho lúa. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh vàng lụi, sâu đục thân hai chấm.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí trong tuần dao động từ $14.8 - 22.0^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 18.4°C , tổng lượng mưa là 2.6mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần lưu ý các loại sâu bệnh

như: bệnh sẹo, rệp sáp. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 18.7 độ C, lượng mưa có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh thán thư, nhện.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô tiếp tục trong giai đoạn phát triển bắp và thu hoạch, theo thống kê, nhiệt độ không khí dao động từ 14.8 - 22.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.4°C, tổng lượng mưa là 2.6mm, cần lưu ý một số bệnh phổ biến: bệnh khô vằn, sâu xám. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế tăng không đáng kể và tổng lượng mưa dự báo có xu hướng giảm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá.

Cây nhãn: đang trong giai đoạn phát triển lộc - chăm sóc. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 3 tháng 1 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 14.8 - 22.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.4°C, tổng lượng mưa là 2.6mm. Cần lưu ý bệnh cháy lá, bọ xít trong giai đoạn này. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng và lượng mưa có xu hướng giảm, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh chổi rồng, sâu đục quả.

Cây chè: đang trong giai đoạn thu hái - đốn, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó, ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè. Theo số liệu thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 14.8 - 22.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.4°C, tổng lượng mưa là 2.6mm, cần chú ý một số bệnh: bệnh đốm nâu, nhện nâu. Dự báo nhiệt độ tuần tiếp theo tăng không đáng kể, lượng mưa dự báo có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè mắt lưới, nhện đỏ.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 3 tháng 1 có nền nhiệt độ dao động 14.8 - 22.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.4°C, tổng lượng mưa là 2.6mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: sâu xanh, sâu cuốn lá đồng thời áp dụng biện pháp cho rau màu vào những ngày trời lạnh như thường xuyên tưới nước cho rau để cây rau không bị đông cứng khi sương muối phủ xuống, nếu sương muối kéo dài thì che phủ bạt nilon hoặc phủ gốc bằng trấu để giữ ấm cho rau. Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh chết cây con, sâu tơ.

Cây lạc: trong khu vực đang ở giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Theo số liệu thống kê, tuần 3 tháng 1 khu vực Đông Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ dao động từ 14.8 - 22.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.4°C, tổng lượng mưa là 2.6mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, rầy mềm. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 15.8 - 21.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.7°C, tổng lượng mưa là 1.4mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình tăng không đáng kể, lượng mưa có xu hướng giảm, nhiệt độ tối thấp khu vực vẫn khoảng 15 độ C, do đó bên cạnh việc chăm đúng kỹ thuật và áp dụng biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả cho các loại cây trồng thì người dân cần áp dụng biện pháp chống rét hiệu quả cho diện tích mạ và rau màu trong khu vực.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng