



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM BỘ Tuần 3 tháng 1 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 1 tại khu vực Nam Bộ dao động từ 21.3 - 30.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.9°C, tổng lượng mưa là 9.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.2^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.8^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.5^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 9.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 3.2$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 8.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.3$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01/02-10/02, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.8	19.9	24.8	0.1
Trong tuần	30.4	21.3	25.9	9.5
Tuần tới	28.2	21.9	25.1	0.8

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Bộ tuần 3 tháng 1 năm 2021 được khái quát như sau:

**Lúa:** Lúa thu đông – mùa đang trong giai đoạn trổ, chín, thu hoạch. Lúa đông - xuân đang trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh, đòng, trổ, chín. Trong giai đoạn đẻ nhánh cần phải giữ mực nước ở mặt ruộng khoảng 1-3cm; trong giai đoạn làm đòng và trổ bông, lúa rất mẫn cảm với nước, thiếu nước lúa sẽ bị nghẹn đòng, trổ bông không đều, hạt lép nên phải điều tiết nước hợp lý. Tuần tới nhiệt độ tương đối thích hợp với sự phát triển của cây lúa, tuy nhiên, lượng mưa tương đối ít, cần bổ sung nước cho cây lúa. Giai đoạn lúa làm đòng cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh gây hại chính là: bệnh đạo ôn lá, rầy hại lúa, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, Sâu đục thân, giai đoạn lúa chín cần lưu ý đến chuột hại.

**Cây rau màu:** đang trong nhiều giai đoạn phát triển, các loại rau màu khu vực Nam Bộ thích hợp với nhiệt độ trong tuần tới, tuy nhiên, lượng mưa trong khu vực tương đối ít, cần bổ sung nước cho cây, lưu ý: các loại sâu khoang, bọ nhảy và sâu cuốn lá phát triển.

**Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi):** đang trong nhiều giai đoạn, các cây trưởng thành đang trong thời kỳ ra hoa kết trái, thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, điều kiện khí tượng tuần tới nhiệt độ tương đối thích hợp với sự phát triển của cây, lượng mưa tương đối ít cần bổ sung tưới

nước cho cây. Tuy nhiên, cần lưu ý các loại sâu bệnh có hại như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu vẽ bùa, sâu xanh, sâu đục cành, bệnh loét, bệnh vàng lá, có thể áp dụng phương pháp loại bỏ cành sâu bệnh, diệt cỏ dại, dùng thuốc trừ sâu bệnh tại nhiều vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Cây xoài: đang trong giai đoạn phát triển cành lá, ra hoa, cần bón phân tưới nước để phát triển, tuần này và tuần tới nhiệt độ không quá cao, thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng này của cây. Trong giai đoạn này của cây xoài cần lưu ý các loại kiến, bọ xít, ruồi vàng, bệnh thán thư, phấn trắng, xỉ mù trái, xỉ mù thân gây hại cho Xoài ở các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang.

Sầu riêng: đang trong giai đoạn chăm sóc, phát triển thân lá nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn này là từ 22-30°C, ẩm độ từ 50 – 60%. Nhiệt độ trong tuần này và tuần tới tương đối thích hợp so với sự phát triển của cây. Lưu ý bổ sung nước cho cây và một số sâu bệnh hại thường xuất hiện trên cây sầu riêng: Rầy phấn; nhện đỏ, rầy lửa; sâu đục thân, đục cành; các bệnh do nấm *Phytophthora palmivora* gây nên; thối vỏ chảy nhựa tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Bình Phước.

Mít: đang trong giai đoạn nuôi quả - thu hoạch, cần bón phân tưới nước để phát triển quả, tuần này và tuần tới nhiệt độ không quá cao, thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng này của cây. Trong giai đoạn này của cây mít cần lưu ý các loại sâu đục thân, đục cành, ruồi đục trái, sâu đục trái, rệp sáp ở các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An, Tiền Giang.

Cây thanh long: đang trong giai đoạn nuôi quả - thu hoạch, cần bón phân tưới nước để phát triển quả, tuần này và tuần tới nhiệt độ không quá cao, thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng này của cây. Trong giai đoạn này của cây thanh long cần lưu ý các loại kiến, bọ xít, ruồi vàng hoặc hiện tượng nứt vỏ trái ở các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cây chôm chôm: đang trong giai đoạn chăm sóc, phát triển thân lá, cần bón phân tưới nước để cây phát triển, tuần này và tuần tới nhiệt độ không quá cao, thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng này của cây. Trong giai đoạn này của cây chôm chôm cần lưu ý các loại kiến, bọ xít, ruồi vàng, sâu đục trái, rệp sáp ở các Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, ...

Cây cao su: đang trong giai đoạn thay lá, cây cao su yêu cầu nhiệt độ cao, thích hợp từ 20-28°C, có biên độ nhiệt độ chênh lệch ít và sợ rét, cây cao su cần nhiều nước, đòi hỏi phải có lượng nước mưa hàng năm cao và đều từ 1.500 - 2.000mm, Nếu mưa to hoặc mưa dầm đều không tốt vì làm cho sâu bệnh nhiều và ít mù, cây cao su yêu cầu độ ẩm không khí tối thiểu từ 75% trở lên. Nhiệt độ tuần này và tuần tới thuận lợi

cho sự phát triển của cây, cần bổ sung nước cho cây. Đề phòng một số bệnh chính trên cây cao su thời kỳ này là: bệnh phấn trắng, bệnh héo đen đầu lá, bệnh nấm hồng.

Điều: đang trong giai đoạn phát triển ra hoa, quả non, với nhiệt độ không khí thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng, tuy nhiên, giai đoạn này cần bón phân, tưới nước, chăm sóc để cây phục hồi và phát triển ổn định. Cần lưu ý đề phòng bệnh loét, bệnh thán thư, sâu đục thân cành, sâu đục rệp lá, ...tiếp tục gây hại tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương.

Dừa: đang trong các giai đoạn, trong giai đoạn kiến thiết cơ bản cần tưới nước bón phân để cây phát triển ổn định, trong giai đoạn kinh doanh cần bón phân hữu cơ, bón phân NPK và tỉa lá để quang hợp. Đề phòng bệnh bệnh cánh cứng, bệnh rệp, kiến vương, bệnh xít và làm cỏ tại các tỉnh Cà Mau, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Trà Vinh.

Sắn: đang trong giai đoạn phát triển thân lá, phát triển củ, thu hoạch. Trong giai đoạn phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp với sự phát triển của cây sắn từ 20 - 32°C, thu hoạch yêu cầu nhiệt độ 25 – 35°C. Nền nhiệt tuần này và tuần tới phù hợp cho sắn phát triển của cây sắn, cần chú ý tưới nước cho cây và một số sâu bệnh chủ yếu: bệnh thối củ, bệnh khảm lá do virus tại các tỉnh Tây Ninh, Long An, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương.

Hồ tiêu: trong giai đoạn nuôi quả, trong giai đoạn này cần cắt tỉa cành, bón phân để cây phát triển. Với nhiệt độ không khí thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng, tuy nhiên cần chú ý bổ sung nước để cây phát triển ổn định. Trong giai đoạn sau thu hoạch, sức đề kháng của hồ tiêu rất yếu, cần thường xuyên theo dõi sâu bệnh để phát hiện và xử lý kịp thời cắt bỏ các bộ phận cây bị bệnh, lưu ý đề phòng các loại bệnh héo chết nhanh, bệnh vàng lá thối rễ tơ, rệp sáp cành, gốc, tuyến trùng rễ tiếp tục gây hại hồ tiêu tại các tỉnh Bình Phước, Kiên Giang, Bình Dương và Đông Nam Bộ.

Cây cà phê: đang trong giai đoạn nuôi quả - thu hoạch, cần bón phân, tưới nước để phát triển quả. Điều kiện khí tượng tuần này và tuần tới với nhiệt độ không quá cao, thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng này của cây. Trong giai đoạn này của cây cà phê cần lưu ý bệnh khô cành, gỉ sắt và bệnh bệnh xít muối ở tỉnh Bình Phước và Đồng Nai.

Cây ngô: đang trong giai đoạn cây con, phát triển thân lá, nhổ cỏ, thu hoạch thời tiết thích hợp cho quá trình phát triển và thu hoạch ngô trong vùng, cần đề phòng bệnh khô vằn, sâu keo.

Mía: đang trong giai đoạn phát triển thân, lóng, cần bón thúc giúp cây mía vươn lóng mạnh, tăng năng suất, tăng chữ đường, với nhiệt độ không khí và lượng mưa trong giai

đoạn này cần chú ý tưới nước để cây phát triển ổn định. Đề phòng bệnh sâu đục thân, bông lá và làm cỏ.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 21.9 - 28.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.1°C, tổng lượng mưa là 0.8mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Bộ có nền nhiệt thuận lợi cho việc phát triển của cây trồng, lượng mưa tương đối ít, cần bổ sung nước cho cây trồng. Nam Bộ đang trong giai đoạn giao mùa, cần chủ động đề phòng mưa dông và lốc xoáy. Đặc biệt, từ đêm 01/0-10/02, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Nguyễn Thanh Tú**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**