



**THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
Tuần 2 tháng 2 năm 2021**

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 2 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 17.2 - 24.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.9°C, tổng lượng mưa là 9.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 32.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 3.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 9.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.1 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21/02-03/03, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét; từ ngày 26/2-3/3 đêm và sáng trời lạnh (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	22.4	17.1	19.7	46.1
Trong tuần	24.7	17.2	20.9	9.6
Tuần tới	27.4	16.7	22.0	0.2

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 2 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: Lúa xuân sớm ở các giai đoạn cấy và bén rễ hồi xanh, lúa chính vụ ở giai đoạn cấy. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 17.2 - 24.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.9°C, tổng lượng mưa là 9.6mm. Nhiệt độ thích hợp cho lúa giai đoạn này là 25°C đến 30°C, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết tuần này không phù hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh thối gốc, sâu cuốn lá lớn. Với số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp tăng trong khi lượng mưa giảm, cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp: bệnh lùn xoắn lá, sâu cuốn lá nhỏ.

Mía: tiếp tục giai đoạn thu hoạch với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25°C, nhiệt độ tuần 2 tháng 2 dao động từ 17.2 - 24.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.9°C, tổng lượng mưa là 9.6mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này tương đối thuận lợi cho thời kỳ phát triển này của cây mía, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh thối đỏ, sâu bốn vạch; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời như biện pháp cắt và tiêu huỷ các cây bị bệnh. Dự báo tuần sau nhiệt độ tăng so với tuần này, dao động từ 16.7- 27.4°C, lượng mưa giảm khoảng 7mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh khảm lá, rầy đầu vàng.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này. Nhiệt độ trong tuần này dao động từ 17.2 - 24.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.9°C, tổng lượng mưa là 9.6mm, theo số liệu dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp

có xu thế tăng trong khi lượng mưa giảm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông như: bệnh thối rễ, côn trùng cánh cứng, sâu đục ngọn, bọ hung nâu.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn mới trồng - mọc mầm, thời kỳ phát triển của mầm, sắn yêu cầu nhiệt độ 20-27°C, theo thống kê nền nhiệt tuần này dao động từ 17.2 - 24.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.9°C, tổng lượng mưa là 9.6mm, điều kiện khí hậu tuần này phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại. Theo dự báo nhiệt độ tuần sau có xu hướng tăng và lượng mưa có xu hướng giảm; cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp.

Ngô xuân: đang trong giai đoạn 3 lá, cây ngô phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ dao động từ 24-30°C. Theo thống kê, nhiệt độ tuần này dao động từ 17.2 - 24.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.9°C, tổng lượng mưa là 9.6mm, có thể nhận thấy nhiệt độ tối thấp trong tuần này tương đối thấp so với khoảng nhiệt độ phù hợp cho ngô phát triển. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần sau lượng mưa giảm và nhiệt độ tăng so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là su hào, cà chua, các loại cải, cà rốt... Nhiệt độ trung bình tuần này là 20.9 độ C, tăng nhẹ so với tuần trước, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ tăng (gần 2 độ C) và lượng mưa giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh chết cây con, sâu xanh.

Cây ăn quả có múi: đang trong giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Theo thống kê số liệu thực đo từ các trạm trong khu vực, nhiệt độ tuần dao động từ 17.2 - 24.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.9°C, tổng lượng mưa là 9.6mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh sẹo, rệp sáp. Nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối rễ, bọ trĩ.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 16.7 - 27.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.0°C, tổng lượng mưa là 0.2mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn kỹ thuật chăm sóc phù hợp với điều kiện thời tiết và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng