



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 2 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 2 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 15.7 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.4°C, tổng lượng mưa là 0.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 43.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 0.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.1 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 22-25/6, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 26/2-03/3, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Đêm và sáng trời lạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	22.0	16.0	19.0	44.0
Trong tuần	23.2	15.7	19.4	0.4
Tuần tới	25.1	19.6	22.3	0.3

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 2 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: theo thống kê tuần 2 tháng 2 diện tích lúa sạ giai đoạn tía dậm; lúa cấy giai đoạn hồi xanh và đẻ nhánh; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 25-32°C. Nhiệt độ tuần này dao động từ 15.7 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.4°C, tổng lượng mưa là 0.4mm, có thể nhận thấy nền nhiệt trong tuần tương đối thấp cho giai đoạn phát triển này của lúa trong khu vực. Người dân cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh tuyến trùng hại rễ, rầy nâu đồng thời tiếp tục sử dụng các biện pháp chống rét cho lúa như: duy trì mực nước trên mặt ruộng từ 2 - 3cm, không bón đạm cho lúa trong những ngày trời rét, nếu lúa bị chết phải dậm lại và chăm sóc kịp thời khi thời tiết ấm. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa thay đổi không đáng kể; cần lưu ý một số loại sâu bệnh: bệnh virus lúa, sâu đục thân.

Cây ăn quả có múi: Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần này dao động từ 15.7 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.4°C, tổng lượng mưa là 0.4mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần chú ý các loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ nám, bệnh loét. Khi phát hiện cây bị nhiễm bệnh cần sử dụng các biện pháp diệt trừ hiệu quả

như: chặt tia cành bị sâu bệnh, phun các loại thuốc trừ sâu như: Trebon 0,1%, thuốc Copper Oxychloride, thuốc Metiram Complex... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 22.3 độ C, lượng mưa thay đổi không đáng kể, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh seò, rệp sáp.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô xuân trong giai đoạn gieo - cây con, ngô phát triển tốt trong khoảng nhiệt độ ngày từ 24 - 30°C. Theo thống kê tuần này có nhiệt độ không khí dao động từ 15.7 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.4°C, tổng lượng mưa là 0.4mm, có thể nhận thấy nền nhiệt tương đối thấp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; chú ý một số bệnh phổ biến: bệnh phấn đen, châu chấu. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế tăng nhẹ (hơn 2 độ C) và tổng lượng mưa dự báo thay đổi không đáng kể so với tuần này, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối gốc, sâu xám.

Cây nhãn: đang trong giai đoạn phát triển lộc - chăm sóc. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 2 tháng 2 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 15.7 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.4°C, tổng lượng mưa là 0.4mm. Cần chú ý bệnh phấn trắng, xén tóc trong giai đoạn phát triển này của cây nhãn. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh khô cành, sâu đục nõn.

Cây chè: đang trong giai đoạn thu hái - đốn, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, nhiệt độ trong tuần dao động từ 15.7 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.4°C, tổng lượng mưa là 0.4mm, chú ý một số sâu bệnh như: bệnh phòng lá chè, rầy xanh. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm trắng, bọ xít.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 2 tháng 2 có nền nhiệt độ dao động từ 15.7 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.4°C, tổng lượng mưa là 0.4mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: sâu xanh, sâu cuốn lá; đồng thời chủ động bón thêm phân kali, phân lân, giảm bón đạm, phun hoặc tưới một số chế phẩm sinh học như KH, PenacP... để cây khỏe mạnh tăng cường khả năng chống rét. Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: nhện đỏ, sâu đục quả.

Cây lạc: đang ở giai đoạn xuân giai đoạn gieo - cây con. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Lạc là cây trồng chịu hạn song chỉ có khả năng chịu hạn ở một giai đoạn nhất định. Theo thống kê, tuần 2 tháng 2 có nền nhiệt độ dao động từ 15.7 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.4°C, tổng lượng mưa là 0.4mm. Có thể nhận thấy nền nhiệt độ trong tuần tương đối thấp cho lạc sinh trưởng

và phát triển; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh héo khô trên hạt, rầy mềm. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 19.6 - 25.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 0.3mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng và lượng mưa giảm, cây trồng cần tiếp tục chăm sóc đúng kỹ thuật và có biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng