



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 2 tháng 2 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 2 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 13 - 18.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.9°C, tổng lượng mưa là 5.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 77.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 1.8 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.8 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23-25/6, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 26/2-03/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	17.7	13.1	15.4	83.1
Trong tuần	18.8	13.0	15.9	5.3
Tuần tới	22.8	16.1	19.4	2.6

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 2 tháng 2 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: lúa đông xuân trà mạ đang trong giai đoạn gieo – nhổ cấy, trà lúa sạ đang trong giai đoạn gieo – tĩa dặm, trà lúa cấy đang trong giai đoạn cấy – bén rễ hồi xanh – đẻ nhánh. Trong giai đoạn này, cây lúa yêu cầu điều kiện nhiệt độ 20-32°C, nước là yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của cây lúa. Trong tuần, nhiệt độ của khu vực dao động 13-18.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.9°C, lượng mưa của khu vực giảm mạnh so với tuần trước 5.3mm. Thời tiết se lạnh, nhiều mây âm u xen kẽ có nắng cùng với lượng mưa không đáng kể, là điều kiện không thuận lợi cho sự phát triển của cây lúa, đồng thời phát sinh một số sâu bệnh hại chính: bệnh đạo ôn lá, rầy các loại. Tuần tới dự báo nhiệt độ của khu vực tăng mạnh dao động 16.1-22.8°C, lượng mưa của khu vực vẫn tiếp tục giảm 2.6mm. Cần chú ý một số sâu bệnh hại có khả năng phát sinh: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm.

Cây ngô Đông: trong khu vực tiếp tục trong giai đoạn phát triển bắp, nhiều diện tích đã cho thu hoạch; Cây ngô Xuân hiện đang trong giai đoạn gieo – 3 lá. Trong

tuần, nhiệt độ trung bình của khu vực tăng khoảng 0.4°C so với tuần trước dao động $13-18.8^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 15.9°C , lượng mưa của khu vực giảm mạnh 5.3mm . Trong giai đoạn gieo – 3 lá, nhiệt độ thích hợp cho cây ngô nảy mầm $25-30^{\circ}\text{C}$ và độ ẩm thích hợp trong khoảng $60-70\%$ độ ẩm tương đối. Điều kiện thời tiết trong tuần không thuận lợi cho cây ngô phát triển. Chú ý: Tưới nước bổ sung cho cây ngô để bảo đảm nảy mầm và phát triển thuận lợi, đồng thời theo dõi một số sâu bệnh hại chủ yếu: Sâu keo mùa thu, sâu xanh... gây hại cục bộ. Dự báo tuần tới nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh, tuy nhiên lượng mưa của khu vực tiếp tục có xu thế giảm 2.6mm ; Cần lưu ý các loại sâu bệnh có khả năng tiếp tục phát sinh trong tuần tới: bệnh gỉ sắt, bệnh đốm lá nhỏ

Cây lạc Xuân: hiện đang trong các giai đoạn gieo – cây con – 2 lá. Cây lạc phát triển tốt ở điều kiện $24-33^{\circ}\text{C}$. Theo số liệu thống kê thực đo, nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động $13-18.8^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 15.9°C , lượng mưa của khu vực 5.3mm . Có thể thấy tuần này, điều kiện thời tiết không thích hợp cho cây lạc sinh trưởng và phát triển. Lưu ý: Tưới ẩm các diện tích lạc mới gieo, bảo đảm đất đủ ẩm để hạt lạc có khả năng nảy mầm tốt, đồng thời lưu ý một số sâu bệnh hại chính: bệnh lở cổ rễ, sâu xám, sâu khoang. Tuần tới, dự báo nhiệt độ trung bình của khu vực tăng mạnh, lượng mưa của khu vực tiếp tục giảm mạnh; Cần chú ý: một số sâu bệnh khả năng gây hại: bệnh lở cổ rễ, sâu xanh.

Cây cà chua: đang trong giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Cây cà chua là loại cây chịu ẩm, nhiệt độ thích hợp cho cây cà chua triển từ $21 - 24^{\circ}\text{C}$. Tuần này nhiệt độ của khu vực dao động $13-18.8^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 15.9°C , lượng mưa của khu vực 5.3mm . Điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích cà chua đã chín. Tuy nhiên với điều kiện thời tiết gần như không có mưa khiến phát sinh một số sâu bệnh hại chính: bệnh nứt quả, bệnh thối đít cà chua, bệnh thối loét cà chua. Sang tuần dự báo, nhiệt độ của khu vực tăng mạnh và tiếp tục có mưa không đáng kể; Cần lưu ý một số bệnh có khả năng phát sinh: bệnh héo lá, bệnh đốm lá..

Cây chè: trong giai đoạn thu hái – đốn. Nhiệt độ của khu vực tuần này trong khoảng $13-18.8^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 15.9°C , lượng mưa của khu vực 5.3mm . Chè là loại cây có yêu cầu điều kiện nhiệt độ không khí trung bình hàng năm $18-23^{\circ}\text{C}$ và độ ẩm không khí trung bình $>80\%$. Với điều kiện thời tiết như trên có thể thấy tuần này thời tiết không thực sự thuận lợi cho cây chè phát triển. Cần lưu ý một số sâu bệnh hại chính: bệnh thối búp, rầy xanh, bọ xít muỗi. Dự báo tuần sau, nhiệt độ của khu vực tăng mạnh, tuy nhiên lượng mưa của khu vực tiếp tục xu thế giảm giảm 2.6mm , khả năng phát sinh một số sâu bệnh hại: bọ cánh tơ, nhện đỏ.

Cây ăn quả có múi: trong khu vực đang trong giai đoạn phát triển quả, phần lớn diện tích đã cho thu hoạch. Tuần này nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 13-18.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.9°C, lượng mưa của khu vực 5.3mm. Điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích quả đã chín, lưu ý một số sâu bệnh hại chính: nhện đỏ, ruồi đục quả. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực tăng nhẹ so với tuần này dao động từ 16.1 - 22.8°C, lượng mưa của khu vực giảm 2.6mm, lưu ý một số sâu bệnh hại có khả năng phát sinh: bệnh chảy gôm, bệnh greening.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 16.1 - 22.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.4°C, tổng lượng mưa là 2.6mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý ... và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng