



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 3 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 3 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 19.7 - 28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.3°C, tổng lượng mưa là 15.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 7.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 12.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 4.7 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 03-11/4, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	27.3	22.1	24.7	3.0
Trong tuần	28.8	19.7	24.3	15.3
Tuần tới	35.0-38.0	22.0-25.0	28.5-31.5	10.0-20.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 3 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa: trong giai đoạn làm đòng. Nhiệt độ thích hợp nhất cho lúa trong giai đoạn phát triển này là 25-32°C. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 19.7 - 28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.3°C, tổng lượng mưa là 15.3mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa tuần này tăng so với tuần trước, điều kiện thời tiết tuần này tương đối thích hợp cho giai đoạn phát triển của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần chú ý một số loại sâu bệnh chính là: bệnh đốm vòng, ốc bươu vàng. Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng (nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.5-31.5°C), cần lưu ý sâu bệnh có khả năng phát triển trong tuần kế tiếp: bệnh thối thân, nhện gié.

Mía: tiếp tục giai đoạn đẻ nhánh với nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25°C, nhiệt độ tuần 3 tháng 3 dao động từ 19.7 - 28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.3°C, tổng lượng mưa là 15.3mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do nền nhiệt tương đối cao, cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh cháy lá, bọ phấn trắng; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời như: thường xuyên kiểm tra, nếu thấy có sâu bệnh thì trừ diệt dứt điểm ngay không để lây lan; bón đạm sớm, cân đối N, P, K. Dự báo tuần sau nhiệt độ tăng so với tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh bồ hóng, sâu đục thân mình tím.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này, theo thống kê số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực, nhiệt độ trong tuần dao động từ 19.7 - 28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.3°C, tổng lượng mưa là 15.3mm và dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng trong khi lượng mưa không thay đổi nhiều, cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: sâu đục ngọn, bọ hung nâu, bệnh gỉ sắt, bệnh tuyến trùng.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 20-32°C, theo thống kê số liệu thực đo từ các trạm, nền nhiệt tuần dao động từ 19.7 - 28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.3°C, tổng lượng mưa là 15.3mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số loại sâu bệnh: rệp sáp, bệnh khảm vi rút. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần sau tăng và lượng mưa dự báo thay đổi không đáng kể so với tuần này, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại.

Ngô: đang trong giai đoạn 3 lá - 9 lá, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 20-30°C. Nhiệt độ tuần này dao động từ 19.7 - 28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.3°C, tổng lượng mưa là 15.3mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh ung thư ngô, sâu xanh đục trái thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần nhiệt độ có xu hướng tăng so với tuần này, lượng mưa dự báo trong khoảng 10.0-20.0mm; người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là cải ngọt, đậu bắp, xà lách... Nhiệt độ trung bình tuần này là 24.3 độ C, tổng lượng mưa là 15.3mm, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của rau màu trong khu vực. Tuy nhiên, cần chú ý một số loại bệnh như: sâu xanh bướm trắng, sâu tơ, bệnh xoắn trùn ngọn; khi phát hiện rau màu nhiễm bệnh có thể áp dụng một số biện pháp như: sử dụng thuốc Elincol 12 ME; V-Bt; Proclaim, Xentari 35WDG, Pegasus 500SC, Amate 150EC... pha theo nồng độ khuyến cáo của nhà sản xuất. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ tăng và lượng mưa thay đổi không đáng kể; cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh chết cây con, sâu vẽ bùa.

Cây ăn quả có múi: đang ở giai đoạn phát triển quả non. Theo thống kê, nhiệt độ tuần này dao động từ 19.7 - 28.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.3°C, tổng lượng mưa là 15.3mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thán thư, nhện.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 35.0-38.0, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 22.0-25.0 và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.5-31.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 10.0-20.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 35.0-38.0 độ C và lượng mưa tương đối thấp, cần chú ý đảm bảo đủ nước cho cây trồng, có biện pháp chống nóng cho cây trồng chịu nắng kém như làm giàn che và chống nóng cho rau và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng