



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 2 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 2 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 17.1 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.1°C, tổng lượng mưa là 5.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 5.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 1.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.9 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 04-06/3, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, tập trung trong ngày 04-05, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Từ đêm 06-07/3 có mưa, mưa rào. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 08-11/3 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.2	15.7	19.4	0.4
Trong tuần	23.2	17.1	20.1	5.8
Tuần tới	25.4	20.2	22.8	5.4

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 2 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: theo thống kê tuần 3 tháng 2 diện tích lúa sạ đang trong giai đoạn tía dậm; mạ chiêm xuân giai đoạn 3 lá - nhỏ cây; nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển trong giai đoạn này là 25-28°C, nền nhiệt độ tuần này dao động từ 17.1 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.1°C, tổng lượng mưa là 5.8mm, có thể nhận thấy nền nhiệt trong tuần tương đối thấp so với giai đoạn phát triển này của lúa trong khu vực. Trong tuần này cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh vàng lụi, sâu đục thân hai chấm, người dân cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, chủ động phun thuốc kịp thời các diện tích lúa bị nhiễm bệnh, có thể sử dụng một số loại thuốc như: Ababeter 1.8 EC, Boama 2.0EC... Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần kế tiếp có xu hướng tăng, lượng mưa thay đổi không đáng kể; cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh đạo ôn, sâu gai.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ thu hoạch - phát triển lộc. Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây ăn quả sinh trưởng và phát triển là 25 - 27°C, theo số liệu thống kê tuần này cho thấy nhiệt độ không khí dao động từ 17.1 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.1°C, tổng lượng mưa là 5.8mm, nền nhiệt thấp so với giai đoạn phát triển này của cây ăn quả trong khu vực. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần lưu ý các loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa.

Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí có xu hướng tăng (2 độ C), lượng mưa thay đổi không đáng kể, cần chú ý một số loại sâu bệnh như bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đông Bằng Bắc Bộ ngô đang trong giai đoạn gieo - cây con, thời tiết tuần này có nhiệt độ dao động từ 17.1 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.1°C, tổng lượng mưa là 5.8mm, nhiệt độ thích hợp cho cây ngô là khoảng 20 - 30°C. Có thể nhận thấy nhiệt độ tuần này tương đối thấp so với giai đoạn phát triển này của cây ngô; lưu ý một số bệnh phổ biến: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ trung bình có xu thế tăng nhẹ và tổng lượng mưa dự báo hầu như không thay đổi so với tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh gỉ sắt ngô, sâu xám.

Cây nhãn: đang trong giai đoạn phát triển lộc và ra hoa. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 3 tháng 2 cho thấy, nhiệt độ dao động từ 17.1 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.1°C, tổng lượng mưa là 5.8mm. Nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn phân hoá mầm hoa là từ 8-17°C, có thể thấy nhiệt độ trong tuần khá cao so với giai đoạn phân hoá mầm hoa của nhãn, trong tuần cần chú ý bệnh khô cành, sâu đục nõn. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Theo dự báo nhiệt độ tuần kế tiếp có xu thế tăng, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh đốm mốc xanh, rệp sáp.

Cây chè: đang trong giai đoạn đôn và phát triển búp, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.1 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.1°C, tổng lượng mưa là 5.8mm, cần chú ý một số bệnh: bệnh đốm nâu, nhện đỏ. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè, rầy xanh.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 3 tháng 2 có nền nhiệt độ dao động từ 17.1 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.1°C, tổng lượng mưa là 5.8mm. Nhiệt độ thích hợp nhất cho rau màu có khả năng chịu lạnh phát triển là trong khoảng 15 - 20°C, và với rau màu chịu nóng là trong khoảng 30-35°C. Có thể nhận thấy điều kiện thời tiết tuần này thuận lợi cho cây chịu lạnh phát triển, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu xám. Dự báo tuần tới, nhiệt độ trong khu vực có xu hướng tăng, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh chết cây con, sâu xanh.

Cây lạc xuân: trong giai đoạn gieo - cây con. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Lạc là cây trồng chịu hạn song chỉ có khả năng chịu hạn ở một giai đoạn nhất định. Nước là yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cây lạc. Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.1 - 23.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.1°C, tổng lượng mưa là 5.8mm, cần chú ý bệnh đốm lá

sớm, sâu ăn lá. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ tăng nhẹ, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: sâu ăn tạp, rầy mềm.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 20.2 - 25.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.8°C, tổng lượng mưa là 5.4mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng và lượng mưa thay đổi không nhiều, các cây trồng cần được chú ý chăm sóc đúng biện pháp kỹ thuật và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng