



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 2 tháng 3 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 3 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 19.1 - 29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa là 13.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.9^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 3.6^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.1^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 4.4$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 4.5$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-23/3, có mưa vài nơi; riêng đêm 21/3 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Từ 24-26/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh. Từ 27-31/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.0	16.4	20.7	10.0
Trong tuần	29.3	19.1	24.2	13.1
Tuần tới	25.0	15.7	20.3	17.1

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 2 tháng 3 năm 2021 được khái quát như sau:

Lúa chiêm xuân: trà sớm đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ - đứng cái, trà chính vụ đang trong giai đoạn đẻ nhánh – đẻ rộ, trà muộn đang trong giai đoạn cây – bén rễ hồi xanh. Trong giai đoạn này, nhiệt độ thích hợp cho cây lúa sinh trưởng và phát triển từ 25-32°C. Theo số liệu thống kê thực đo tại các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này, nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh so với tuần trước (trung bình khoảng 3.5°C) dao động trong khoảng 19.1-29.3°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 13.1mm, điều kiện nhiệt độ tương đối thích hợp cho cây lúa phát triển. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh: bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ...tiếp tục là đối tượng chủ yếu gây hại trên lúa chiêm xuân. Bên cạnh việc phòng chống sâu bệnh hại, người dân cần chú ý bảo đảm nhu cầu nước cho cây lúa theo từng giai đoạn, cụ thể: đối với các diện tích lúa trong giai đoạn cây – bén rễ hồi xanh cần duy trì mực nước trong ruộng từ 1-3cm, đối với các diện tích lúa trong giai đoạn đẻ nhánh – đẻ rộ cần áp dụng biện pháp tưới nước “Uớt – Khô xen kẽ”, đối với các diện tích lúa trong giai đoạn đứng cái cần duy trì mực nước trong ruộng khoảng 5cm; đồng thời định kỳ bón phân hợp lý thúc cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Dự báo, tuần tiếp theo do ảnh hưởng của không khí lạnh

nền nhiệt độ của khu vực có xu thế giảm mạnh, dao động ở mức 15.7-25.0°C, cần chú ý một số đối tượng sâu bệnh hại: bệnh đạo ôn, rầy các loại...phát sinh gây hại.

Cây ngô xuân: hiện đang trong các giai đoạn cây con – 3 lá, 5 lá – xoáy nõn. Ở thời kỳ này, cây ngô phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ 20-30°C và độ ẩm khoảng 65-70% độ ẩm tối đa của đồng ruộng. Trong tuần, nhiệt độ của khu vực dao động 19.1-29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa của khu vực 13.1mm, điều kiện thời tiết tương đối thích hợp cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. Lưu ý các đối tượng sâu bệnh gây hại chủ yếu: Sâu keo mùa thu, bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực giảm mạnh trung bình khoảng 3.5°C so với tuần này, lượng mưa của khu vực có xu thế tăng nhẹ. Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của các loại Sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây lạc xuân: tiếp tục trong giai đoạn gieo – phát triển thân lá. Cây lạc sống tốt trong điều kiện nhiệt độ 25-30°C. Tuần 2 tháng 3 khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động 19.1-29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa của khu vực 13.1mm, điều kiện nhiệt độ tương đối thích hợp cho cây lạc phát triển, tuy nhiên, lượng mưa của khu vực khá nhỏ 13.1mm, vì vậy, cần lưu ý nhu cầu nước cho cây lạc nhất là giai đoạn gieo hạt – nảy mầm, ngoài ra cần tiến hành bón lót, làm cỏ và xới đất nhẹ khi cây lạc đạt 3 -4 lá thật. Trong tuần, bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh tiếp tục gây hại chủ yếu cho cây lạc. Tuần tới, dự báo nền nhiệt độ của khu vực có xu thế giảm mạnh (do ảnh hưởng của không khí lạnh), lượng mưa của khu vực tăng không đáng kể, cần tiếp tục chú ý các đối tượng sâu bệnh hại: bệnh lở cổ rễ, sâu xanh ăn lá...

Cây cam (Hòa Bình): tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc – hoa. Điều kiện nhiệt độ thích hợp cho cây cam phát triển 23-29°C. Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực tăng mạnh so với tuần trước, trung bình khoảng 3.5°C, dao động trong khoảng 19.1-29.3°C, lượng mưa của khu vực tăng không đáng kể 13.1mm. Điều kiện nhiệt độ tương đối thuận lợi cho cây cam phát triển. Bệnh chảy gôm, bệnh greening tiếp tục phát sinh gây hại trong tuần. Dự báo, tuần tiếp theo, nền nhiệt độ của khu vực giảm mạnh dao động 15.7-25.0°C, lượng mưa dự báo của khu vực tăng không đáng kể, chú ý bảo đảm nhu cầu nước cho cây cam trong thời kỳ ra lộc – hoa, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây chè trong giai đoạn phát triển búp – thu hái. Tuần 2 tháng 3 khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ tăng mạnh so với tuần trước dao động trong khoảng 19.1-29.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.2°C, tổng lượng mưa của khu vực 13.1mm. Chè là loại cây có yêu cầu điều kiện nhiệt độ không khí trung bình hàng năm 18-23°C và độ ẩm không khí trung bình >80%. Với điều kiện như trên có thể thấy tuần này thời tiết tương đối thuận lợi cho cây chè phát triển. Trong tuần, cây chè chịu ảnh hưởng của một số sâu bệnh hại chính: sâu cuốn lá non, sâu cuốn búp,...Dự báo tuần tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, nền nhiệt độ của khu vực giảm mạnh, lượng mưa của khu vực tăng không đáng kể, cần tiếp tục theo dõi diễn biến của một số sâu bệnh hại chủ yếu: bọ xít bông, sâu nhóm kèn..


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 15.7 - 25°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.3°C, tổng lượng mưa là 17.1mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ giảm, lượng mưa của khu vực tăng không đáng kể, các cây trồng cần được chú ý bảo đảm đủ nước, dinh dưỡng và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Nguyễn Thị Chang**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**