



Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 1 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 1 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 17.0 - 23.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.3°C, tổng lượng mưa là 23.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 12.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 7.4 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 8.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 03-05/02, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 06-11/02, có mưa vài nơi; riêng ngày 08-09/02 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	21.7	16.7	19.2	36.0
Trong tuần	23.5	17.0	20.3	23.2
Tuần tới	20.0-23.0	11.0-14.0	15.5-18.5	10.0-20.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Xuân sớm	4 lá - đẻ nhánh	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 17.0 - 23.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.3°C, tổng lượng mưa là 23.2mm; cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đạo ôn, ốc bươu vàng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu phù hợp.
Mía		Tích lũy đường	Nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này của mía là 20-25°C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 17.0 - 23.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.3°C, tổng lượng mưa là 23.2mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh khảm lá, rầy đầu vàng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như bón phân cân đối, không bón quá nhiều

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			phân đạm.
Thông		Kiến thiết cơ bản	Thống kê số liệu trong tuần cho thấy nhiệt độ tối thấp là 17.0 độ C, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh tuyến trùng, sâu róm thông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu diệt trừ mầm bệnh.
Sắn	Đông	Thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 17.0 - 23.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.3°C, tổng lượng mưa là 23.2mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối củ sắn, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.
Ngô	Đông	Thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 25-28 độ C, nhiệt độ trong tuần thấp (nhiệt độ dao động từ 17.0-23.5 độ C) so với giai đoạn phát triển này của ngô, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu cho phép.
Rau màu	Đông	Phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy điều kiện thời tiết tuần này dao động từ 17.0 - 23.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.3°C, tổng lượng mưa là 23.2mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh chết cây con, sâu xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể bón phân đủ liều lượng để tăng sức đề kháng cho cây.
Cây ăn quả		Chín - sau thu hoạch	Số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ dao động từ 17.0 - 23.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.3°C, tổng lượng mưa là 23.2mm; cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh tàn lụi, sâu đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương áp dụng biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây cà phê		Phân hoá mầm hoa	Số liệu dự báo cho thấy tuần kế tiếp nhiệt độ tối thấp dao động trong khoảng 11.0-14.0 độ C và lượng mưa dao động trong khoảng 10.0-20.0mm; cần chú ý một số sâu bệnh như: sâu đục thân, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 20.0-23.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 11.0-14.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 15.5-18.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 10.0-20.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có nền nhiệt thấp do đó cây trồng cần được áp dụng các biện pháp chống rét hiệu quả như phủ nilon, tưới đủ dinh dưỡng đồng thời sử dụng thuốc diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng