



Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 1 tháng 1 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 1 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 12.7 - 18.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.6°C, tổng lượng mưa là 5.0mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.0°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 1.7\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 17.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.5\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 13-15/01, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, riêng vùng núi đêm 15 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét trong ngày 14, sau đêm và sáng trời rét. Từ ngày 16-17/01, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng trời rét; từ ngày 17 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 18-21/01, có mưa nhỏ vài nơi, riêng ngày từ 19-20/01 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 22-23/01 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	14.4	10.9	12.6	4.9
Trong tuần	18.5	12.7	15.6	5.0
Tuần tới	23.0-26.0	11.0-14.0	17.0-20.0	15.0-30.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 1 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Chiêm xuân sớm	Gieo - 5 lá	Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng cho thấy nhiệt độ trong tuần khu vực Đông Bắc khá thấp, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh sương mai, sâu đục thân hai chấm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc phòng trừ sâu bệnh đồng thời áp dụng biện pháp chống rét cho mạ như: Luôn giữ ẩm đủ ẩm cho mạ bằng cách giữ nước ở rãnh (đối với mạ dục non), tuyệt đối không để mạ bị khô hạn; rắc tro bếp mục lên trên mặt luống để giữ ẩm cho mạ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Vải		Phát triển lộc	Cây vải là một trong những cây trồng chủ đạo ở Bắc Giang, Bắc Ninh; với điều kiện khí tượng trong tuần cùng giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh chết rũ cây, bọ xít nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần sử dụng những loại thuốc phòng trừ sâu bệnh phù hợp.
Cây ăn quả		Thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng tuần này có nhiệt độ trung bình thấp: 15.6 độ C, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp phù hợp.
Ngô	Đông	Phun râu - phát triển bắp	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 18-22 độ C; cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần sử dụng thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Rau màu	Đông	Thu hoạch	Thống kê cho thấy nhiệt độ trong tuần thấp với nhiệt độ tối thấp là 12.7 độ C; do đó cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng các loại thuốc trừ sâu phù hợp.
Sắn	Đông	Thu hoạch	Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tối thấp trong khoảng 11.0-14.0 độ C, cần lưu ý một số sâu bệnh trong tuần này như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng.
Lạc	Đông	Phát triển củ	Số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nền nhiệt độ khu vực Đông Bắc trong tuần thấp, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, rầy mềm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần sử dụng một số loại thuốc trừ sâu bệnh phù hợp.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 11.0-14.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.0-20.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 15.0-30.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ ấm hơn so với tuần này, cần sử dụng biện pháp chống rét cho lúa và rau màu như: Phun hoặc tưới một số chế phẩm sinh học như KH, PenacP... để tăng khả năng chống chịu cho mạ; tưới nước trên mặt lá làm tan sương để tránh hiện tượng cháy lá cho rau màu khi có ánh nắng đồng thời có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Quách Thị Thanh Tuyền

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng