



Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 1 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 1 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 20.1 – 24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.1°C, tổng lượng mưa là 112.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 81.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 36.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 82.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-12/01, có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Từ ngày 13-16/01, có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Từ ngày 17-21/01, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc ngày 19-21/01 có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.1	18.9	21.0	194.5
Trong tuần	24.2	20.1	22.1	112.6
Tuần tới	26.0-29.0	16.0-19.0	21.0-24.0	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 1 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông Xuân	Mới gieo - mạ	Trong tuần, do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến cho nền nhiệt độ của khu vực ở mức thấp, đồng thời xảy ra mưa vừa đến mưa to ở một số khu vực khiến nhiều diện tích mạ bị ngập úng, sinh trưởng và phát triển chậm. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa trong tuần cần lưu ý: ốc brou vàng, chuột, bệnh đạo ôn lá... phát sinh gây hại.

Cây ngô	Mùa (2021)	Phun râu – chín sữa - thu hoạch	Tuần 1 tháng 1, nền nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 22.1°C, lượng mưa của khu vực đạt 112.6mm. Đối với cây ngô vụ Đông Xuân (2021-2022) đang trong giai đoạn mới trồng – cây con, cây ngô yêu cầu điều kiện ngoại cảnh chủ yếu là nước, nhiệt độ và không khí. Nhiệt độ thích hợp cho cây ngô lúc này từ 25.0-30.0°C (tối thấp từ 10.0-12.0°C, tối cao từ 40.0-45.0°C), độ ẩm đất từ 60-70% độ ẩm tương đối và đất thông thoáng khí. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây ngô ở hầu hết các giai đoạn. Trong tuần, cây ngô chịu tác động bởi một số đối tượng gây hại: sâu xám, sâu đục thân, bệnh khô vằn... Trong quá trình chăm sóc, người dân cần lưu ý diễn biến sâu bệnh hại, tranh thủ bắt thủ công khi mật độ sâu bệnh hại thấp nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
	Đông xuân (2021-2022)	Mới trồng – cây con	
Cây lạc	Mùa (2021)	Chắc quả - thu hoạch	Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực có xu thế tăng, lượng mưa có xu thế giảm. Cụ thể: nhiệt độ không khí trung bình tuần này của khu vực đạt 22.1°C (tăng 1.1°C so với tuần trước), lượng mưa tuần này của khu vực đạt 112.6mm (giảm 81.9mm so với tuần trước). Điều kiện thời tiết trong tuần phù hợp với sinh trưởng của cây lạc; chú ý đối với các diện tích lạc Đông Xuân cần làm đất tơi xốp, thông thoáng khí để cây lạc dễ dàng mọc mầm. Bệnh héo rũ gốc mốc đen/mốc trắng, sâu xám, sâu khoang... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây lạc Đông Xuân mới trồng người dân cần chú ý để chủ động phòng trừ kịp thời.
	Đông xuân (2021-2022)	Mới trồng – cây con	
Cây sắn	Niên vụ 2021	Phát triển củ - thu hoạch	Đại đa số diện tích sắn trong khu vực đang trong giai đoạn thu hoạch, một số ít còn lại đang trong giai đoạn phát triển củ. Tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất đạt 20.1°C, nhiệt độ cao nhất đạt 24.2°C, nhiệt độ trung bình đạt 22.1°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 112.6mm. Cây sắn trong khu vực tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch, người dân cần nhanh chóng thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm, thu gom và tiêu hủy

			những cây bị nhiễm, dọn sạch cỏ dại để hạn chế sâu bệnh hại cho vụ sau.
Cây ăn quả có múi		Thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch	Tuần 1 tháng 1, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 20.1-24.2°C, lượng mưa của khu vực đạt 112.6mm. Thời tiết trong tuần của khu vực khá phù hợp với sinh trưởng của cây ăn quả có múi trong giai đoạn này. Cần lưu ý: tiếp tục thu hoạch các diện tích quả đã chín; các diện tích đã thu hoạch xong cần tiến hành vệ sinh vườn, cắt tỉa cành, vun gốc, tăng cường chăm sóc và bón phân cân đối giúp cho cây ăn quả phục hồi sau một mùa thu hoạch quả.
Cây cao su		Khai thác mủ	Cây cao su sinh trưởng bình thường trong điều kiện nhiệt độ từ 22.0-25.0°C, thuận lợi nhất từ 26.0-28.0°C. Trong thời kỳ khai thác mủ, yếu tố nhiệt độ có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình khai thác mủ ở cây cao su. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, tuần này khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 22.1°C, thấp nhất đạt 20.1°C. Trong điều kiện nhiệt độ thấp sinh cho quá trình sinh trưởng cũng như cho mủ khi khai thác ở cây cao su diễn ra chậm, năng suất kém. Bệnh xì mủ, bệnh loét sọc miệng cao, bệnh đốm mắt chim... tiếp tục là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây cao su trong tuần.
Cây hồ tiêu		Thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch	Thời tiết của khu vực Trung Trung Bộ trong tuần này với nền nhiệt độ dao động trong khoảng 20.1-24.2°C, lượng mưa của khu vực đạt 112.6mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây tiêu. Cần lưu ý nhanh chóng thu hoạch các diện tích tiêu còn lại; các diện tích tiêu đã thu hoạch cần lưu ý rửa cây bằng thuốc nhằm tiêu diệt hết mầm bệnh còn sót, cắt tỉa cành làm thông tán, thu gom và đốt bỏ toàn bộ cành lá đã cắt bỏ và lá rụng dưới gốc để hạn chế sâu bệnh hại trú ngụ lây lan sang vụ sau.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 16.0-29.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.0-24.0°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng là 20.0-40.0mm. Do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, lượng mưa có xu hướng

giảm. Một số chú ý đối với các loại cây trồng trong tuần tới: Bên cạnh bảo đảm nhu cầu về nước, dinh dưỡng và phòng chống sâu bệnh hại đối với tất cả các loại cây trồng; Riêng đối với cây lúa cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm đất để bảo đảm gieo cấy đúng lịch thời vụ, chủ động chăm sóc, bón phân, tía dặm bảo đảm mật độ cây lúa trên đồng ruộng...; Đối với cây ăn quả có múi: tiếp tục vệ sinh lại vườn cây, cắt tỉa cành lá, bón phân, vun gốc giúp cây phục hồi sau khi thu hoạch; Đối với cây sắn: cần tranh thủ thời tiết tạnh ráo tiến hành làm đất và chuẩn bị nguồn giống sắn sạch cho niên vụ 2022.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng