



Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 10 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 10 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 21.4 - 27.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.4°C, tổng lượng mưa là 186.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 150.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 60.9 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 126.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 6.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-03/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng ngày 01-02/11 trời rét. Từ ngày 04-06/11, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trời lạnh. Từ ngày 07-11/11, có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.7	20.3	23.0	36.0
Trong tuần	27.4	21.4	24.4	186.8
Tuần tới	27.0-30.0	18.0-21.0	22.5-25.5	40.0-80.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 10 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây mía		Vươn lóng - tích lũy đường	Nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn vươn lóng – tích lũy đường của mía là 28-35°C. Theo thống kê từ bảng 1 có thể nhận thấy điều kiện khí hậu chưa phải thích hợp nhất cho mía sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này. Lưu ý một số sâu bệnh chủ yếu như: sâu đục thân mía, bọ phấn trắng, bệnh cần mía gốc; thường xuyên thăm ruộng mía, khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp và hiệu quả.
Cây lạc	Đông	Gieo – phân cành – ra hoa	Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24 – 33°C. Theo thống kê từ bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây lạc sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này. Lưu ý các bệnh đốm nâu, đốm đen và bệnh gỉ sắt; sâu xám phát triển mạnh ở thời tiết ẩm cao, lạnh, xuất hiện ở giai đoạn cây con và gây hại nặng nhất ở vùng đất thịt nhẹ, đất cát.

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây sắn		Phát triển củ - thu hoạch	Giai đoạn phát triển củ sắn yêu cầu nhiệt độ 25-35°C. Sắn sinh trưởng phát triển chậm khi nhiệt độ vượt quá 40°C. Ở nhiệt độ dưới 10°C sắn ngừng sinh trưởng và bị chết. Thống kê từ bản 1 cho thấy điều kiện thời tiết chưa phải thuận lợi nhất cho cây sắn sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này. Lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng; khi phát hiện bệnh có thể tiến khoanh vùng những diện tích bị nhiễm, thu gom cây bị nhiễm, áp dụng các biện pháp (đốt, phun thuốc bảo vệ thực vật cho toàn bộ diện tích nhiễm và lân cận).
Cây ngô	Đông	Gieo – 7 lá	Ngô phát triển tốt trong khoảng nhiệt độ từ 24 - 30°C; nhiệt độ trên 38°C ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây. Theo thống kê từ bảng 1 có thể nhận thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho ngô sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này. Lưu ý một số loại sâu bệnh như: sâu xám, sâu đục thân và đục bắp, rệp cò, bệnh khô vằn, đốm lá, bệnh phấn đen; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương phun thuốc trừ sâu thích hợp.
Rau màu		Cây con – thu hoạch	Bệnh xoắn lá virus tiếp tục gây hại trên cây cà chua. Các đối tượng sinh vật hại như sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, sâu khoang, ruồi đục lá, bệnh phấn trắng, bọ trĩ, nhện đỏ phát sinh gây hại nhẹ.
Cây ăn quả		KTCB – chín – thu hoạch – chăm sóc	Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp, sâu vẽ bùa phát sinh và gây hại tăng; Bệnh vàng lá thối rễ phát sinh gây hại tăng tại các vùng chuyên canh; bệnh Greening, bệnh thán thư tiếp tục gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 27.0 – 30.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 18.0 – 21.0°C nhiệt độ không khí trung bình 22.5 – 25.5°C, tổng lượng mưa là 40.0 – 80.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng