



Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tuần 1 tháng 10 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 10 tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 20.5 - 27°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.8°C, tổng lượng mưa là 102.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể bằng tuần này tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 67mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 32.2\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 27.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 8.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 12-13/10, có mưa rào và dông vài nơi. Từ đêm 13-16/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ 17-22/10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 21-22/10 có mưa rào và dông rải rác. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.1	20.8	23.4	169.5
Trong tuần	27.0	20.5	23.8	102.5
Tuần tới	28.0-31.0	19.0-22.0	23.5-26.5	50.0-100.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên tuần 1 tháng 10 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Lúa	Mùa trà sớm	Chắc xanh – thu hoạch	Trong giai đoạn mạ, nhiệt độ thích hợp trong khoảng $25-30^{\circ}\text{C}$. Thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển từ $25-32^{\circ}\text{C}$. Theo bảng thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Trong tuần sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấu phát sinh gây hại lúa Mùa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trổ, mức độ hại phổ biến nhẹ - trung bình. Ngoài ra, Chuột hại rải rác trên các trà lúa, ốc brou vàng gây hại trên lúa Mùa, lúa Thu Đông giai đoạn sạ - mạ - đẻ nhánh, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình.
	Mùa chính vụ	Mạ - đẻ nhánh – đòng trổ	
	Thu Đông (Đắc Lắc)	Sạ - mạ	

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Ngô	Vụ mùa 2022	Cây con – phát triển thân lá	Đối với giai đoạn cây con, P TTL nhiệt độ thích hợp cho ngô sinh trưởng và phát triển từ 25-28°C. Theo thống kê cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng phát triển của cây ngô. Trong tuần sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại có dấu hiệu tăng so với kỳ trước và giảm so với CKNT.
Sắn	ĐX 2021-2022	Nuôi củ - Thu hoạch	Thời kỳ cây con nhiệt độ thích hợp là 20-27°C. Giai đoạn phát triển củ sắn yêu cầu nhiệt độ 25-35°C. Thống kê từ bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sắn. Trong tuần bệnh khảm lá virus gây hại có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT, bệnh phân bố chủ yếu tại Đắk Lắk, Gia Lai.
	Hè Thu 2022	P TTL - tạo củ	
	Mùa 2022	Cây con	
Rau màu		Nhiều giai đoạn	Bọ nhảy, bệnh sung rễ, bệnh thối nhũn, sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng trên rau họ hoa thập tự. Ruồi đục lá, bệnh mốc sương, xoắn lá virus, đốm đen tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình trên rau họ cà.
Sầu riêng		Chăm sóc sau thu hoạch	Sầu riêng sinh trưởng và phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24 – 35°C. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển. Bệnh xì mũ phát sinh gây hại có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và tăng so với CKNT.
Cà phê		Nuôi quả - chắc quả	Nhiệt độ thích hợp đối với cà phê chè từ 18–25°C, thích hợp nhất từ 20 - 22°C. Cà phê vối phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 22 - 26°C, giới hạn nhiệt độ thích hợp nhất từ 24 - 26°C. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển ở các giai đoạn này. Trong tuần bệnh gỉ sắt có dấu hiệu tăng so với kỳ trước và giảm so với CKNT; bệnh khô cành có diện tích nhiễm tăng so với kỳ trước và giảm so với CKNT. Bệnh phân bố chủ yếu tại tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk.
Hồ tiêu		Quả non nuôi quả	Đề cây tiêu sinh trưởng và phát triển thuận lợi, nhiệt độ thích hợp dao động từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thích hợp cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây hồ tiêu ở giai đoạn này. Trong tuần

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
			tuyến trùng gây hại tương đương so với kỳ trước và giảm so với CKNT, phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng; bệnh chết nhanh diện tích nhiễm giảm so với kỳ trước và tăng so với CKNT, phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk; bệnh chết chậm có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.
Điều		Chăm sóc – ra đọt non	Nhiệt độ độ thích hợp để cây điều sinh trưởng và phát triển tốt là 24 đến 28°C, lượng nước cần từ 28 – 50mm/tuần. Từ thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho các quá trình sinh trưởng và phát triển của cây điều ở giai đoạn này. Trong tuần bộ xít muối có dấu hiệu gây hại tăng so với kỳ trước và giảm so với CKNT; bệnh thán thư có dấu hiệu gây hại tăng so với kỳ trước và giảm so với CKNT. Bệnh phân bố chủ yếu tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: nhiệt độ tối cao dao động trong khoảng từ 28.0 – 31.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 19.0 – 22.0°C nhiệt độ không khí trung bình 23.5 – 26.5°C, tổng lượng mưa là 50.0 – 100.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Nguyên có nền nhiệt độ giảm lượng mưa giảm, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước đối với khu vực ruộng khô, thoát nước cho ruộng trũng ngập và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng