


Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 1 tháng 10 năm 2022


### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 10 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 18.8 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.0°C, tổng lượng mưa là 116.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .




Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 86.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 35.8$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 114.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.8$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 12-22/10, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.4	21.1	23.7	203.5
Trong tuần	25.3	18.8	22.0	116.8
Tuần tới	26.0-29.0	18.0-21.0	22.0-25.0	0.0-5.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 1 tháng 10 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Phơi màu - chín sữa - chín sấp - thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, tuần này nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực có xu thế giảm đáng kể so với tuần trước. Cụ thể, nhiệt độ không khí trung bình tuần này của khu vực giảm 1.7°C so với tuần trước (nhiệt độ không khí trung bình tuần trước đạt 23.7°C), lượng mưa trong tuần này đạt 116.8mm (giảm 86.7mm so với tuần trước). Trong điều kiện nhiệt độ thấp hơn, cây lúa sinh trưởng chậm lại. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lúa trong tuần: rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ xít dài, sâu cuốn lá nhỏ, sâu cắn gié... phát sinh gây hại chủ yếu trên các trà lúa muộn hiện

			đang trong giai đoạn phơi màu – chín sữa – chín sấp.
Cây ngô	Hè thu	Phát triển bắp – chín sấp – chín – thu hoạch	Cây ngô sinh trưởng thuận lợi trong điều kiện nhiệt độ từ 24.0-30.0°C. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 18.8-25.3°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 116.8mm. Có thể nhận thấy, điều kiện lượng mưa trong tuần này khá phù hợp với yêu cầu của cây ngô; tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh vào cuối tuần khiến cho nền nhiệt độ của khu vực giảm thấp, cây ngô sinh trưởng kém hơn. Trong tuần, cây ngô tiếp tục chịu tác động bởi các đối tượng: sâu keo mùa thu, sâu xám, sâu đục bắp... Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại để chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời.
	Đông	Gieo trồng – mọc mầm - 8 lá	
Cây lạc	Hè thu	Củ non – chắc củ - thu hoạch	Trong tuần này, cây lạc trong khu vực Việt Bắc tiếp tục trong giai đoạn củ con – chắc củ, một số ít diện tích đã cho thu hoạch. Nhiệt độ trung bình trong tuần này của khu vực đạt 22.0°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 116.8mm; lượng mưa tuần này của khu vực giảm đáng kể giúp cho quá trình thu hoạch các diện tích lạc củ đã già thuận lợi hơn. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây lạc chủ yếu: rầy xanh lá mạ, đóm lá, gỉ sắt...
Cây sắn		Phát triển thân lá – phát triển củ	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực dao động trong khoảng 18.8-25.3°C, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 116.8mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây sắn. Cây sắn trong khu vực hiện đang sinh trưởng và phát triển bình thường. Bệnh khảm lá sắn do virus, sùng trắng, bọ phấn trắng... tiếp tục là các đối

			tượng gây hại chủ yếu trên cây sắn trong tuần cần chú ý.
Cây ăn quả có múi	Cam	Phát triển quả - quả xanh – quả chín	So với tuần trước, tuần này khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm đáng kể. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần này của khu vực tương đối phù hợp cho cây ăn quả có múi sinh trưởng và phát triển cũng như công tác thu hoạch các diện tích quả đã chín. Trong tuần này, cây ăn quả có múi chịu tác động bởi các đối tượng: nhóm nhện nhỏ, ruồi đục quả, ngày mọt đỏ, rệp, bệnh ghẻ sẹo... người dân cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng gây hại và chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.
	Bưởi	Quả xanh – chín – thu hoạch	
Cây vải		Phát triển lộc	Trong tuần này, cây vải trong khu vực Việt Bắc tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc. Lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 116.8mm, tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây vải lúc này. Trong tuần, đối tượng sâu đo ăn lộc non, sâu ăn lá, sâu đục thân... tiếp tục phát sinh gây hại trên cây vải. Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại để chủ động phun thuốc phòng trừ kịp thời, tránh để cho các đối tượng phát sinh gây hại mạnh và trên diện rộng sẽ ảnh hưởng lớn đến vụ vải năm sau. Bên cạnh đó, tùy theo tình hình sinh trưởng của cây, cần chú ý bón thúc cho lộc thu cho cây vải một cách hợp lý.
Cây chè		Phát triển búp – thu hái	Tuần 1 tháng 10, nền nhiệt độ trung bình của khu vực đạt 22.0°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 116.8mm, nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối phù hợp cho cây chè phát triển. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây chè: rầy xanh, bọ cánh tơ, sâu đục thân, nhện...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 18.0-29.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.0-25.0°C, tổng lượng mưa là 0.0-5.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ giảm, lượng mưa không đáng kể. Trong tuần tới, các loại cây trồng cần được chú ý: Tranh thủ điều kiện thời tiết tạnh ráo, tập trung thu hoạch các diện tích cây trồng vụ Mùa 2022 có thể cho thu hoạch, sau thu hoạch nhanh chóng dọn dẹp và vệ sinh lại đồng ruộng để chuyển sang trồng các loại cây trồng vụ Đông bảo đảm đúng theo khung lịch thời vụ; Trong điều kiện thời tiết gần như không có mưa, cần chú ý bảo đảm đủ nước cho các loại cây trồng còn lại để bảo đảm cho các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh; Tiếp tục các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối và hợp lý để giúp các loại cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi cũng như sâu bệnh hại; Tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

**THỰC HIỆN**

**Nguyễn Thị Chang**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**