



Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 11 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 11 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 25.4 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.1°C, tổng lượng mưa là 208.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 120.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 64.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 163.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-22/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 23-24/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 25/11-01/12, có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 26-27/11 có mưa rào và dông rải rác. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	30.4	23.7	27.0	88.1
Trong tuần	28.9	25.4	27.1	208.3
Tuần tới	29.0-32.0	22.0-25.0	25.5-28.5	30.0-60.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 2 tháng 11 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Cây lúa	Lúa mùa trà chính vụ	Đòng trổ - chắc xanh - thu hoạch	Quá trình sinh trưởng – phát triển của cây lúa chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện ngoại cảnh. Điều kiện khí hậu, thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến các quá trình sinh trưởng – phát triển, quá trình hình thành năng suất lúa. Điều kiện thời tiết thuận lợi cho lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Trong tuần sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa Mùa giai đoạn đòng- trổ. Sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt, bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ trên lúa Mùa ở giai đoạn ngâm sữa - chắc xanh.
	Lúa Đông Xuân trà sớm	Xuống giống – mạ	
Ngô	Vụ mùa 2022	PTTL – trổ cờ - phun râu	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực nền nhiệt tuần này dao động từ 25.4 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình là 27.1°C, tổng lượng mưa là 208.3mm. Những giai đoạn ngô 3-4 lá, 7-10 lá, xoáy loa kèn, tung phần phun râu và

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
			chín sữa ngổ rất cần nước, tuy nhiên, không được để nước đọng gây ngập úng, rễ ngổ sẽ bị thối, lá héo vàng. Trong tuần, mưa to gây ngập sâu một số vùng trong khu vực. Do đó, người dân cần tiêu thoát nước và xử lý đồng ruộng không được để nước đọng gây ngập úng. Trong tuần bệnh đốm lá, bệnh khô vằn, chuột, sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ. Người dân cần theo dõi chặt chẽ tình hình sinh vật gây hại, phòng chống kịp thời và hiệu quả.
Sắn	ĐX 2021-2022	Nuôi củ - thu hoạch	Trong giai đoạn cây con nhiệt độ thích hợp cho sắn sinh trưởng và phát triển dao động từ 20 - 27°C. Thời kỳ nuôi củ nhiệt độ thích hợp 25-35°C. Sắn sinh trưởng phát triển chậm khi nhiệt độ vượt quá 40°C. Ở nhiệt độ dưới 10°C sắn ngừng sinh trưởng thân lá và bị chết. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sắn ở các giai đoạn này. Lưu ý các đối tượng sinh vật như: bọ phấn trắng, rệp sáp phát sinh gây hại cục bộ. Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan và gây hại tại các vùng trồng sắn trong khu vực.
	Hè Thu 2022	PTTL – nuôi củ	
	Mùa 2022	Cây con	
Rau màu		Nhiều giai đoạn	Lượng mưa trong tuần tương đối lớn, gây thiệt hại nhiều vùng trồng hoa màu đến thời kỳ thu hoạch, người dân cần khẩn trương tiêu thoát nước và xử lý đồng ruộng để trồng mới, tận thu các vùng còn thu hoạch được. Trong tuần các đối tượng sinh vật hại như sâu tơ, sâu xanh, bọ nhày, sâu khoang, ruồi đục lá, bệnh phấn trắng, bọ trĩ, nhện đỏ phát sinh gây hại nhẹ. Bệnh xoắn lá virus tiếp tục gây hại trên cây cà chua. Cần lưu ý triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.
Thanh Long		Chăm sóc - thu hoạch	Từ bảng 1 thống kê điều kiện thời tiết trong tuần có nền nhiệt dao động từ 25.4 - 28.9°C, nhiệt độ không khí trung bình là 27.1°C, tổng lượng mưa là 208.3mm, trong tuần xuất hiện những trận mưa lớn trong khu vực, do đó người dân cần chủ động tiêu thoát nước cho diện tích thanh long, đồng thời chú ý một số loại bệnh như: thối đầu cành, bệnh đốm nâu tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh. Khi phát hiện bệnh cần cắt bỏ những cành bị nhiễm bệnh, cạo bỏ những phần thịt lá bị bệnh đem tiêu hủy hạn chế tránh lây lan.

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Sầu riêng		Chăm sóc sau thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng trong tuần qua. Trong tuần bệnh xì nứt thân mũ gia tăng diện tích nhiễm, nhất là trên những vườn chăm sóc kém, không thoát nước tốt; bệnh thán thư tiếp tục hại.
Hồ tiêu		Nuôi quả - chắc quả	Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Từ bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây tiêu trong tuần qua. Trong tuần bệnh tuyến trùng hại rễ, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, rệp các loại tiếp tục gây hại. Bệnh chết nhanh, chết chậm gây hại, nhất là trên các vườn tiêu không thoát nước tốt. Người dân cần lưu ý thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chủ động phòng tránh sâu bệnh và thoát nước kịp thời cho những diện tích trũng.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 29.0 – 32.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 22.0 – 25.0°C nhiệt độ không khí trung bình 25.5 – 28.5°C, tổng lượng mưa là 30.0 – 60.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng