



Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tuần 1 tháng 11 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 11 tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 17.7 - 27.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.6°C, tổng lượng mưa là 50.6mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 58.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 16.8 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 30.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-21/11, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng từ ngày 12-14/11, phía Nam có mưa rào và dông rải rác. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên

| Đặc trưng | Nhiệt độ không khí (°C) | | | Lượng mưa (mm) |
|------------|-------------------------|-----------|------------|----------------|
| | Tối cao | Tối thấp | Trung bình | |
| Tuần trước | 27.4 | 19.3 | 23.3 | 108.7 |
| Trong tuần | 27.5 | 17.7 | 22.6 | 50.6 |
| Tuần tới | 28.0-31.0 | 20.0-23.0 | 24.0-27.0 | 10.0-30.0 |

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên tuần 1 tháng 11 năm 2022 được khái quát như sau:

| Cây trồng | Mùa vụ | Đặc trưng sinh trưởng | Khuyến cáo/Lưu ý |
|-----------|--------------------|-----------------------------|--|
| Lúa | Mùa trà sớm | Chín – thu hoạch | Thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng và phát triển từ 25-32°C. Theo bảng thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết chưa phải là thuận lợi nhất cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Trong tuần chuột hại rải rác cục bộ trên các trà lúa; ốc bươu vàng di chuyển và lây lan theo nguồn nước và gây hại rải rác trên lúa Thu đông giai đoạn mạ. Bệnh khô vằn, bệnh lem lép thối hạt tiếp tục gây hại trên lúa Mùa sớm giai đoạn chín - thu hoạch, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng. |
| | Mùa chính vụ | Đẻ nhánh – đòng trổ | |
| | Thu Đông (Đắk Lắk) | Đẻ nhánh – đứng cái | |
| Ngô | Vụ mùa 2022 | Phát triển thân lá – trổ cờ | Đối với giai đoạn PTTL, trổ cờ nhiệt độ thích hợp cho ngô sinh trưởng và phát triển từ 25-28°C, lượng nước cần ổn định để cây phát triển, cần để phòng bệnh khô vằn, sâu keo. |
| Sắn | ĐX 2021-2022 | Nuôi củ - Thu hoạch | Giai đoạn cây con nhiệt độ thích hợp là 20-27°C. Giai đoạn phát triển củ sắn yêu cầu nhiệt độ 25-35°C. Thống kê từ bảng 1 cho thấy điều kiện |

| Cây trồng | Mùa vụ | Đặc trưng sinh trưởng | Khuyến cáo/Lưu ý |
|------------------|---------------|-------------------------------|--|
| | Hè Thu 2022 | PTTL – nuôi củ | thời tiết chưa phải thuận lợi nhất cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sắn. Trong tuần bệnh khảm lá virus gây hại có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT, bệnh phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai. |
| | Mùa 2022 | Cây con | |
| Rau màu | | Nhiều giai đoạn | Bọ nhảy, bệnh sung rễ, bệnh thối nhũn, sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng trên rau họ hoa thập tự. Ruồi đục lá, bệnh mốc sương, xoắn lá virus, đốm đen tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình trên rau họ cà. |
| Sầu riêng | | Chăm sóc sau thu hoạch | Điều kiện thời tiết tuần này và tuần tới thuận lợi cho giai đoạn sinh trưởng của cây. Trong giai đoạn này, việc xử lý nấm và sâu bệnh hại sau khi thu hoạch cực kỳ quan trọng. Nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của sầu riêng. Bên cạnh đó, những vết thương do quá trình thu hoạch trái cũng mở đường cho nấm khuẩn tấn công mạnh mẽ. Một số bệnh thường xuất hiện trên cây sầu riêng giai đoạn này như: bệnh thán thư, bệnh nấm hồng, bệnh thối gốc xì mù,... và côn trùng gây hại ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. |
| Cà phê | | Nuôi quả - chín bói-thu hoạch | Nhiệt độ thích hợp đối với cà phê chè từ 18–25°C, thích hợp nhất từ 20 - 22°C. Cà phê vối phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 22 - 26°C, giới hạn nhiệt độ thích hợp nhất từ 24 - 26°C. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển ở các giai đoạn này. Trong tuần bệnh khô cành có diện tích nhiễm giảm so với kỳ trước và tăng so với CKNT; bệnh gỉ sắt có dấu hiệu tăng so với kỳ trước và tăng so với CKNT. Bệnh phân bố chủ yếu tại tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk. |
| Hồ tiêu | | Nuôi quả | Cây tiêu sinh trưởng và phát triển thuận lợi, nhiệt độ thích hợp dao động từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thích hợp cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây hồ tiêu ở giai đoạn này. Trong tuần bệnh chết nhanh diện tích nhiễm giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT, phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk; bệnh chết chậm có dấu hiệu giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông; |

| Cây trồng | Mùa vụ | Đặc trưng sinh trưởng | Khuyến cáo/Lưu ý |
|------------------|---------------|------------------------------|---|
| | | | tuyến trùng gây hại giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT, phân bố chủ yếu tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. |
| Điều | | Chăm sóc – ra đợt non | Từ thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết chưa phải thuận lợi nhất cho các quá trình sinh trưởng và phát triển của cây điều ở giai đoạn này. Giai đoạn này cần bón phân, chăm sóc để cây điều phát triển lộc, chuẩn bị ra hoa. Trong tuần bệnh thán thư có dấu hiệu gây hại giảm so với kỳ trước và giảm so với CKNT; bọ xít muỗi có dấu hiệu gây hại tăng so với kỳ trước và giảm so với CKNT. Bệnh phân bố chủ yếu tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk. |

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 28.0 – 31.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 20.0 – 23.0°C nhiệt độ không khí trung bình 24.0 – 27.0°C, tổng lượng mưa là 10.0 – 30.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Nguyên có nền nhiệt độ giảm, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng