



Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 12 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 12 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 12.6 - 19.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.2°C, tổng lượng mưa là 45.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 30.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 15.2\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 15.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 3.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Ngày 01/01/2023 có mưa vài nơi, trời rét. Từ ngày 02-10/01/2023 có mưa vài nơi; có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, riêng từ chiều tối và đêm 04-07/01 có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Trời rét. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	22.7	13.8	18.2	15.6
Trong tuần	19.8	12.6	16.2	45.8
Tuần tới	18.0-21.0	15.0-18.0	16.5.0-19.5.0	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Xuân sớm	Gieo, mạ 3 - 5 lá	Thời kỳ cây mạ, mặt luống cần được giữ ẩm để rễ phát triển thuận lợi. Theo thống kê các trạm khí tượng trong tuần dao động từ 12.6 - 19.8 $^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 16.2 $^{\circ}\text{C}$, tổng lượng mưa là 45.8mm, cho thấy nhiệt độ tương đối thấp, khi nhiệt độ dưới 15 $^{\circ}\text{C}$ vào ban đêm người dân cần chủ động các biện pháp chống rét cho mạ như: cho nước vào trong ruộng ngập 1/2 - 1/3 chân mạ, để giữ ẩm cho cây mạ được khỏe mạnh, đến sáng thì nên rút cạn nước trong ruộng và phủ kín nilong lên trên mặt luống. Lưu ý chuột, ốc bươu vàng tiếp tục phát sinh và gây hại phổ biến ở mức độ nhẹ - trung bình.
Cây mía		Tích lũy đường - chín	Nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 25 $^{\circ}\text{C}$ đến 35 $^{\circ}\text{C}$, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy: nhiệt độ trong tuần dao động từ 12.6 - 19.8 $^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 16.2 $^{\circ}\text{C}$, tổng lượng mưa 45.8mm,

			điều kiện thời tiết chưa phải thích hợp nhất cho mía trong các giai đoạn này, cần chú ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh than, sâu mình hồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp cho mía.
Cây lạc	Đông	Phát triển quả - vào chắc	Thống kê từ bảng 1 cho thấy nhiệt độ trong tuần qua tương đối thấp (giao động từ 12.6 độ C đến 19.8 độ C), thời tiết có sương mù vào sáng sớm, đêm và sáng có ngày trời rét đậm. Trong giai đoạn này lạc cần nhiệt độ cao, ẩm độ đầy đủ, dinh dưỡng nhiều. Nhiệt độ giảm xuống 20°C quả ngừng phát triển. Người dân cần chú ý tăng cường các biện pháp chăm sóc, tưới nước, bón phân nhằm tăng sức chống chịu với điều kiện thời tiết cho lạc, đồng thời, lưu ý một số sâu bệnh gây hại như: bệnh lở cổ rễ, rầy mềm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo quy định.
Cây sắn		Tích lũy bột – thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 12.6 - 19.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.2°C, tổng lượng mưa là 45.8mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp cho sắn.
Cây ngô	Đông	Gieo – 8-9 lá – xoáy nõn – chín sữa	Đối với giai đoạn này, nhiệt độ thích hợp cho cây ngô là khoảng 20 - 30°C. Cây ngô cần ít nước nhưng cần đảm bảo đủ ôxy cho rễ phát triển. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 12.6 - 19.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.2°C, tổng lượng mưa là 45.8mm. Lưu ý tưới đủ nước cho ngô nhất là giai đoạn 8-9 lá và 2 tuần trước và sau trổ, đặc biệt sau khi bón phân. Lưu ý bệnh khô vằn, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng phân bón hợp lý tăng sức đề kháng cây trồng
Rau màu		Phát triển thân lá – thu hoạch	Nhiệt độ dự báo cho tuần tiếp theo nhiệt độ tương đối thấp (15 – 18 độ C), người dân cần chủ động phòng chống rét cho rau màu như: Bón bổ sung thêm phân kali, phân lân, giảm bón đạm để cây khỏe mạnh tăng cường khả năng chống rét. Những ngày có sương muối giá buốt, cần tưới nước trên mặt lá làm tan sương để tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng.
Cây ăn		Phát triển	Từ bảng 1 cho thấy nhiệt độ dao động từ 12.6 -

quả		lộc, chín, thu hoạch, chăm sóc	19.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.2°C, tổng lượng mưa là 45.8mm. Đối với giai đoạn KTCB cần lưu ý cắt tỉa bộ khung, tán, nếu cây ra hoa, quả thì tỉa bỏ để cây tập trung dinh dưỡng tạo khung tán. Tranh thủ những ngày nắng ráo thu hoạch. Đối với những vườn đã thu hoạch xong, cần cắt tỉa tất cả các cành sâu bệnh, cành chết, cành vượt, những cành quá dày, sao cho cây có bộ khung tán cân đối.
-----	--	--------------------------------	---

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 18.0 – 21.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 15.0 – 18.0°C nhiệt độ không khí trung bình 16.5 – 19.5°C, tổng lượng mưa là 20.0 – 40.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng nhẹ, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng