



Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 12 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 12 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 15.8 - 19.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.8°C, tổng lượng mưa là 6.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 7.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 8.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 7.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.5^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 6.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 50mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 1.7\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.7\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-21/12, có mưa vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 12-15/12 trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Từ ngày 17/12 trời rét đậm, vùng núi rét hại. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.0	23.3	25.6	56.2
Trong tuần	19.8	15.8	17.8	6.2
Tuần tới	19.0-22.0	08.0-11.0	13.5-16.5	3.0-7.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây ăn quả có múi		Chín - thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo, tổng lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 6.2mm. Có thể nhận thấy, lượng mưa của khu vực trong tuần rất phù hợp cho công tác thu hoạch các diện tích cây ăn quả có múi đã chín bảo đảm chất lượng tốt. Do đó, người dân cần tranh thủ những ngày thời tiết tạnh ráo để tập trung thu hoạch các diện tích quả có múi đã chín. Tuy nhiên, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ăn quả có múi để bảo đảm cho cây sinh trưởng tốt trong điều kiện thời tiết gần như không có mưa. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục thân cành, ruồi đục quả, bệnh vàng lá gân xanh...
Cây ngô	Đông	Xoáy nõn - trở cò - phun râu - phát triển bắp - thu hoạch	Trong tuần này, cây ngô trong khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục trong nhiều giai đoạn khác nhau. Điều kiện thời tiết trong tuần này tương đối thuận lợi việc thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm. Đối với các diện tích ngô còn lại (nhất là giai đoạn ngô đang trở cò - phát triển bắp) thì

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			<p>lượng mưa trong tuần không đáp ứng đủ nhu cầu về nước của cây ngô. Hơn nữa, trong tuần này, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khiến cho nền nhiệt độ của khu vực giảm thấp. Trong điều kiện thời tiết lạnh và gần như không có mưa, cây ngô sinh trưởng chậm, ảnh hưởng lớn tới quá trình tạo hạt và tích trữ chất khô trong hạt, từ đó gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của bắp ngô thành phẩm. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô, trong khi tưới nên bón thêm phân bổ sung cho cây ngô (chú trọng phân lân và kali) để giúp cây ngô sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu trước điều kiện ngoại cảnh bất lợi. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu keo mùa thu, sâu đục thân, sâu đục bắp, rệp hại ... người dân cần chú ý theo dõi và chủ động có các biện pháp để phòng trừ kịp thời và hiệu quả.</p>
Cây lạc	Đông	Phát triển thân lá – ra hoa – đâm tia	<p>Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 15.8-19.8°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 6.2mm. Trong giai đoạn ra hoa, cây lạc cần đầy đủ độ ẩm và nhiệt độ tối thích; trong giai đoạn này, điều kiện nhiệt độ thấp sẽ khiến cho số lượng hoa trên cây lạc bị giảm sút, từ đó gây ảnh hưởng đến số lượng củ lạc được hình thành. Với điều kiện nhiệt độ và lượng mưa trong tuần như trên, có thể nhận thấy thời tiết của khu vực trong tuần không thuận lợi cho sinh trưởng của cây lạc nên cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây và có các biện pháp chống rét cho cây lạc (sử dụng rơm rạ, cỏ khô để ủ quanh gốc cây; bón bổ sung thêm phân lân và kali để giúp cây tăng khả năng chống chịu trước điều kiện thời tiết rét...). Trong tuần, cây lạc chịu tác động chủ yếu bởi các đối tượng: sâu xám, bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá, gỉ sắt...</p>
Cây nhãn		Phát triển lộc	<p>Trong tuần này, cây nhãn trong khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục trong giai đoạn phát triển lộc. Điều kiện thời tiết trong tuần tương đối thuận lợi cho việc kìm hãm sự bật lộc đông trên cây nhãn. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần tiếp tục các biện pháp nhằm hạn chế sự xuất hiện của lộc đông trên cây nhãn: khoan cành, xiết nước ... đồng thời thường xuyên kiểm tra vườn nhãn và kịp thời phát hiện những lộc đông xuất hiện sớm để</p>

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			tiến hành ngắt bỏ kịp thời. Trong thời kỳ này, các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây nhãn: sâu đục thân/cành, sâu đục gân lá, bọ xít, bệnh thán thư, bệnh sương mai ... người dân cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại và chủ động phòng trừ kịp thời khi thấy mật độ gây hại vượt quá mức cho phép.
Cây chè		Hái tận thu – đốn	Đại đa số các diện tích chè trong khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đã chuyển sang giai đoạn đốn, phần ít diện tích còn lại hiện đang hái tận thu. Trong tuần này, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa thấp, có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần tương đối thuận lợi cho công tác đốn chè cũng như vệ sinh lại đồi chè sau khi thu hoạch. Do đó, người dân cần tranh thủ thời tiết để tiến hành công tác đốn chè tùy thuộc theo sinh trưởng của từng nương chè để lựa chọn phương pháp đốn chè phù hợp; sau khi đốn, cần thu gom toàn bộ phân thân cành đã bị đốn cùng với lá rụng dưới gốc để đốt bỏ nhằm hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng gây hại trên cây chè. Trong tuần, do phần lớn các diện tích chè đã cho thu hoạch nên các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây chè không đáng kể.
Rau màu	Đông	Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	Tuần 1 tháng 12, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có lượng mưa đạt 6.2mm. Trong điều kiện thời tiết tạnh ráo, việc thu hoạch các diện tích rau màu đã có thể cho thu hoạch diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, do tuần này khu vực gần như không có mưa, cùng với ảnh hưởng từ không khí lạnh mạnh tràn làm cho nền nhiệt độ của khu vực giảm thấp gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây rau màu các loại, trực tiếp gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cây rau thành phẩm. Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý tưới nước kết hợp bón phân để giúp cây rau màu sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi. Các đối tượng: sâu tơ, sâu xanh, sâu cuốn lá, rệp, bệnh thối thân ... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây rau màu các loại cần chú ý.
Cây sắn		Phát triển củ - thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 15.8-19.8°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 6.2mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần rất

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			thuận lợi cho công tác thu hoạch cũng như chế biến và bảo quản củ sắn đã đạt thành phẩm, người dân cần tranh thủ thời tiết để tiến hành thu hoạch các diện tích sắn củ có thể cho thu hoạch. Trong tuần, cây sắn tiếp tục chịu tác động chủ yếu bởi các đối tượng: bệnh khảm lá sắn do virus, sùng trắng ...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 8.0-22.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 13.5-16.5°C, tổng lượng mưa là 3.0-7.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ thấp, lượng mưa không đáng kể. Trong thời gian tới, các loại cây trồng cần được chú ý: Bảo đảm cung cấp đủ nước cho cây trồng, riêng đối với cây nhãn cần tiếp tục xiết nước để kìm hãm sự phát triển của lộc đông trên cây nhãn; Chủ động các biện pháp để chống rét cho cây trồng (chú trọng bón phân lân và kali, sử dụng nilong hoặc rơm rạ để giúp giữ ấm cho cây trồng); Theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại trên các loại cây trồng và có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

**THỰC HIỆN:** Nguyễn Thị Chang

**KIỂM SOÁT:** Phạm Thị Kim Phụng