



Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 12 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 12 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 12.5 - 22.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.5°C, tổng lượng mưa là 0.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.0°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.0°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.0°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 5.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 0.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 9.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 1.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-27/12, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng ngày 26-27/12 có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Từ ngày 28-31/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng đêm 28 và ngày 29/12 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	19.8	15.8	17.8	6.2
Trong tuần	22.5	9.8	16.1	0.5
Tuần tới	20.0-23.0	10.0-13.0	15.0-18.0	5.0-15.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây ăn quả có múi		Chín - thu hoạch	Cây ăn quả có múi trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn chín – thu hoạch. Trong tuần này, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 12.5-22.5°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 0.5mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích quả có múi đã chín bảo đảm chất lượng tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh cùng với lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thấp nên để bảo đảm cho cây ăn quả có múi sinh trưởng tốt thì người dân cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ăn quả có múi, đồng thời tiến hành dùng rơm rạ, cỏ khô, nilong, ... để tủ xung quanh gốc cây, để giúp giữ ẩm cho cây trong những ngày giá rét và giúp cỏ dại không thể mọc lên. Trong tuần, cây ăn quả có múi chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi các đối tượng: sâu đục quả, bệnh loét,

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây ngô	Đông	Xoáy nõn - phát triển bắp - thu hoạch	<p>bệnh ghẻ sẹo...</p> <p>Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần đạt 17.5°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 0.5mm. Tương tự như với tuần trước, tuần này thời tiết của khu vực lạnh – rét và độ ẩm không khí thấp giúp cho việc thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm diễn ra thuận lợi, tuy nhiên, cũng do điều kiện thời tiết trong tuần lạnh và khô khiến cho cây ngô sinh trưởng kém cũng như công tác chăm sóc cây ngô trở nên khó khăn hơn. Để bảo đảm cho cây ngô sinh trưởng tốt hơn, người dân cần chú ý tưới đủ ẩm cho cây ngô, đồng thời chú ý bón bổ sung đầy đủ dinh dưỡng (tăng cường lượng phân lân và kali để giúp cây tăng khả năng chống chịu trước điều kiện thời tiết lạnh giá). Một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu đục bắp, sâu đục thân, rệp hại, bệnh khô vằn ...</p>
Cây lạc	Đông	Đâm tia – tạo củ	<p>So với tuần trước, tuần này khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ giảm không đáng kể, với mức giảm của nhiệt độ không khí trung bình 0.3°C, tổng lượng mưa của khu vực trong tuần không đáng kể. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần lạnh và khô khiến cho việc đâm tia, tia hình thành củ ở cây lạc bị ảnh hưởng, từ đó gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng củ lạc thành phẩm nên cần được tưới thêm nước bổ sung để bảo đảm nhu cầu về nước của cây lạc, ngoài ra, cần chú ý giữ ẩm cho cây lạc trong điều kiện thời tiết lạnh – rét (sử dụng rơm rạ, cỏ khô để ủ quanh gốc, chú trọng bón phân lân và kali để giúp cây lạc tăng cường khả năng chống rét). Sâu xám, sâu khoang, bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá, gỉ sắt... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây lạc trong tuần cần chú ý.</p>
Cây nhãn		Phát triển lộc	<p>Tuần 2 tháng 12, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 12.5-22.5°C, tổng lượng mưa trong tuần của khu vực 0.5mm. Với điều kiện thời tiết trong tuần như trên, việc kìm hãm sự phát triển của lộc đông trên cây nhãn để giúp cây nhãn ngủ đông tạo điều kiện cho việc phân hóa mầm hoa trên cây nhãn tiếp tục diễn ra thuận lợi. Trong giai đoạn này, người dân cần thường xuyên kiểm tra vườn cây để kịp thời phát hiện những mầm đông mọc sớm cũng các đối</p>

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			trọng sâu bệnh gây hại trên cây nhãn (bọ xít nâu, nhện lông nhung, bệnh thán thư, bệnh sương mai ...) để kịp thời có các biện pháp xử lý kịp thời.
Cây chè		Đón cành	Cây chè trong khu vực Đồng bằng Bắc Bộ hiện đã chuyển sang giai đoạn đón. Thời tiết của khu vực trong tuần này tương đối thuận lợi cho công tác đón chè cũng như vệ sinh lại các đồi chè sau khi thu hoạch. Trong giai đoạn đón, cần lựa chọn phương pháp đón chè phù hợp với sinh trưởng của từng diện tích chè cụ thể. Sau khi đón, cần thu gom các cành đã đón để tiến hành đốt bỏ để hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng gây hại trên cây chè hoặc ép thành phân để bón cho cây vụ tới; tiến hành phun một đợt thuốc trừ sâu để tiêu diệt những đối tượng sâu bệnh còn sót lại trên cây chè; trong điều kiện thời tiết lạnh và khô cần bảo đảm tưới đủ ẩm, sử dụng rơm rạ, cỏ khô ... để tủ quanh gốc chè để giúp giữ ẩm cho cây.
Rau màu	Đông	Phát triển thân lá - thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, thời tiết của khu vực trong tuần này chủ đạo là lạnh và khô. Trong điều kiện thời tiết như trên, cây rau màu các loại sinh trưởng và phát triển chậm gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của rau thành phẩm. Trong giai đoạn này, cần chú ý: đối với các diện tích rau đã đến thời kỳ thu hoạch thì cần thu hoạch ngay để tránh bị ảnh hưởng do điều kiện thời tiết lạnh; đối với các diện tích đang phát triển cần tưới nước đủ ẩm để giữ ẩm cho cây rau, ngoài ra, kết hợp tủ gốc cho cây bằng rơm rạ, tro bếp để giữ ẩm đồng thời nên tưới phân kali và lân cho cây để giúp cây tăng khả năng chống rét. Một số đối tượng gây hại trên cây rau màu trong tuần cần chú ý: sâu xanh ăn lá, sâu tơ, sâu khoang, rầy mềm ... khi phát hiện các diện tích nhiễm sâu bệnh vượt quá mức cho phép cần phun thuốc phòng trừ ngay (lưu ý bảo đảm đúng thuốc, đúng liều lượng và bảo đảm dư lượng thuốc còn lại nằm trong tiêu chuẩn cho phép khi thu hoạch).
Cây sắn		Phát triển củ - thu hoạch	Tuần 2 tháng 12, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 17.5°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 0.5mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần thuận lợi cho công tác thu hoạch, chế biến các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm. Do đó, người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung thu hoạch cây sắn. Sau

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			thu hoạch, cần nhanh chóng dọn dẹp và vệ sinh lại đồng ruộng, tiến hành thu gom và tiêu hủy toàn bộ phế phẩm còn lại của cây sắn cũng như cỏ cũ còn lại trong ruộng để hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng gây hại sang vụ tiếp theo. Bệnh khảm lá sắn do virus, sùng trắng tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây sắn trong tuần.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 10.0-23.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 15.0-18.0°C, tổng lượng mưa là 5.0-15.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tiếp tục có nền nhiệt độ thấp, lượng mưa không đáng kể. Trong thời gian tới, các loại cây trồng cần được chú ý: Tiến hành cày lật đất để chuẩn bị xuống giống lúa Đông Xuân, Chủ động nguồn nước để tưới cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng (ngô, lạc, đậu tương ...); Có các biện pháp để chống rét cho cây trồng (sử dụng nilong che phủ trên mặt ruộng, dùng rơm rạ, cỏ khô, tro bếp ... để ủ xung quanh gốc cây nhằm giữ ấm cho cây); Tăng cường lượng phân bón hợp lý (chú trọng phân lân và kali) để giúp cây tăng khả năng chống chịu trước điều kiện thời tiết lạnh giá; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại trên các loại cây trồng và có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng